

The background features a teal-to-blue gradient with various circular and semi-circular patterns. On the left side, there is a large circular scale with numerical markings from 140 to 260 in increments of 10. Several smaller circles and arcs are scattered across the background, some with arrows indicating direction. The overall aesthetic is clean and modern, typical of a professional presentation or academic slide.

PSICOPATOLOGIA DE LA PERCEPCIÓN Y LA IMAGINACIÓN

- Ilusión: Transformación subjetivo de un dato realmente presente.
- Alucinación: Nada dice acerca de la realidad, es tan solo producto de la mente.. Las mas frecuentes son las auditivas.
- Sensación: Toda estimulación que tenemos ante nuestros sentidos. ESTIMULO- RECEPTOR- CEREBRO
- PERCEPCION: Acto de toma de conocimientos de datos sensoriales del mundo que nos rodea.

- PSICOPATOLOGIA DE LA PERCEPCION ;
- EL PROBLEMA NO ESTA EN LOS ORGNAOS DE LOS SENTIDOS (TS DE LA SENSACIÓN), SINO EN LA CONTRUCCION PSICOLOGICA QUE LA PERSONA ELABORA A PARTIR DE UN DETERMINADO ESTIMULO SENSORIAL RECIBIDO POR UN RECEPTOR QUE SE ENCUENTRA INDEMNE.

ALTERACIONES DE LA PERCEPCION

- ILUSIONES
- ALUCINOSIS
- PERCEPCIONES INDUCIDAS POR ALUCINOGENOS
- ALUCINACIONES Y SEUDOALUCINACIONES
- ALUCIONACIONES EXPERIMENTALES.
- OTRAS: AUTOSCOPIA, METAMORFOPSIAS, IMAGEN EIDETICA, ALUCINACIONES HIPNOPOMPICAS E HIPNAGOGICAS.


ILUSIONES

- EN LA ILUSION SE DEFORMA UNA REALIDAD ; LAS CARACTERISTICAS SON:
- PRESENCIA REAL DEL ESTIMULO
- DEFORMACION DE LO PERCIBIDO
- AUSENCIA DE CONVENCIMIENTO ABSOLUTO DE LO PERCIBIDO.

- SUELE SUCEDER EN SUJETOS SANOS, CON MENOR FRECUENCIA EN PATOLOGIA PSIQUIATRICA.

ILUSIONES

- CAUSAS
- SEGÚN JASPERS
- DEFICIENCIAS DE LA CAPACIDAD ATENCIONAL: PX SOMNOLIENTOS, FATIGADOS, EN CRISIS DE PANICO Y EN INTOXICADOS.
- ESTADO EMOCIONAL: ILUSIONES CATATIMICAS EJEMPLO., ILUSIONES VISUALES DE PX HISTÉRICOS GRAVES, SOMBRAS EN LA HABITACION QUE CORRESPONDNE A FIGURAS MASCULINAS.
- ILUSIONES INDUCIDAS VOLUNTARIAMENTE: DEJANDO JUEGO A LA FANTASIA. SON PAREIDOLIA O IMAGEN DESIDERATIVA. EJEMPLOS: FIGURAS EN EL CIELO.



ALUCINOSIS

- DESCRITAS POR WERNICKE EN ALCOHOLICOS COMO ALUCINACIONES AUDITIVAS CON LIGERA AFECTACION DEL NIVEL DE CONCIENCIA Y JUICIO DE LA REALIDAD PRESERVADO.
- SE CARACTERIZA POR:
- ALUCINACIONES INTENSAS EN CUALQUIER ESFERA SENSORIAL (ESPECIALMENTE AUDITIVAS Y VISUALES)
- PRESENCIA VARIABLE CON OSCILACIONES.
- AGODISTONICAS, NO INTEGRADAS EN LA PERSONALIDAD.
- CONCIENCIA DE IRREALIDAD.
- NATURALEZA ORGÁNICA.

PERCEPCIONES INDUCIDAS POR ALUCINOGENOS

- LAS ALTERACIONES PERCEPTIVAS DEL SINDROME PSICODÉLICO SE CARACTERIZA POR
- DEFORMACION DE LA AUDICION
- DIFICULTAD PARA LOCALIZAR OBJETOS ASI COMO SU FORMA Y COLOR
- ALUCINACIONES INTENSAS QUE EN OCASIONES SE MODIFICAN EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS.



ALUCINACIONES Y SEUDOALUCINACIONES

- ALUCINACIONES SE TRATAN DE PERCEPCIONES SIN OBJETO REAL CUYAS CARACTERISTICAS DE NITIDEZ Y CORPORALIDAD LAS APROXIMAN A LAS PERCEPCIONES NORMALES.
- SU CARÁCTER PATOLOGICO SE DEBE A ;
- NO EXISTE UN ESTIMULO REAL
- NO DUDA DE LO VIVENCIADO
- ES ACEPTADA POR EL CONOCIMIENTO COMO SI FUERA UNA IMAGEN SENSORIAL EXTERNA.
- LA CONDUCTA DEL SUJETO ES CONSECUENTE CON LA EXPERIENCIA ALUCINATORIA.

- SEUDOALUCINACIONES O FALSAS ALUCINACIONES SE CARACTERIZAN POR:
- EL PX NO LAS RELACIONA CON NINGUNA MODALIDAD SENSORIAL.
- SUCEDEN EN LA MENTE DEL ENFERMO.
- SE VIVENCIAN COMO REALES. ESTE ULTIMO PUNTO PERMITE HACER EL DX DIFERENCIAL CON LAS IMÁGENES OBSESIVAS DE ALGUNOS PX.
- LAS SEUDOALUCINACIONES ORIENTAN AL DX DE ESQUIZOFRENIA.

ALUCINACIONES EXPERIMENTALES

- SUCEDEN EN ESIMULACION ELECTRICA CORTICAL Y SUBCORTICAL Y DURANTE EL AISLAMIENTO O DEPRIVACION SENSORIAL.
- SUS CARACTERISTICAS SON SIMILARES A LAS ALUCINACIONES E ILUSIONES.
- TIENE UN FUERTE CARÁCTER SENSORIAL.
- SUELEN SER IMÁGENES DISTORCIONADAS CON COLORIDO Y GEOMETRICAS DE CORTA DURACION: NO RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS MENTALES DEL PX.

OTRAS ALTERACIONES DE LA PERCEPCION

- AUTOSCOPIA: VISION DE UNO MISMO EN EL ESPACIO EXTERIOR, SUELE DURAR UNOS SEGUNDOS Y VA ACOMPAÑADA DE MIEDO. (LESION EN EL CUERPO CALLOSO).
- POLIOPIA: VISION DE IMÁGENES MULTIPLES AUN CON LOS OJOS CERRADOS.
- METAMORFOPSIAS: DISTORCION EN EL TAMAÑO Y FORMA DE LOS OBJETOS.
- IMAGEN EIDETICA ES LA VISION ACTUAL DE UNA IMAGEN VISUALIZADA EN EL PASADO, NO ES VOLUNTARIO, INTERVIENEN MECANISMOS DE LA MEMORIA Y EMOCIONALES, EJEMPLO DEJA VU

PSICOPATOLOGIA DE LA MEMORIA

- MEMORIA; PROCESO PSICOFISIOLOGICO LOCALIZADO EN SNC QUE PERMITE LA CAPACIDAD DE ADQUIRIR, DE FORMA CONSCIENTE O INCONSCIENTE, RETENER Y UTILIZAR, CON ESFUERZO O DE FORMA AUTOMATICA UNA EXPERIENCIA.

- El Olvido.
- La función de éste es impedir la sobrecarga de datos inútiles o de poco uso en el almacén de la memoria.
- Cuando la pérdida de memoria no es atribuible a un proceso normal de olvido, se afirma que existe Amnesia –denominación genérica.

- Amnesia ; Incapacidad total o parcial de registrar, retener o evocar información.
- TIPOS;
- **Amnesia Total**, el individuo pierde la memoria completamente, se olvida de su vida. Bergson decía que: “...sin memoria no tengo experiencia, ni educación, ni me acuerdo lo que quiero mostrar...”. En consecuencia, sin memoria no hay carácter ni personalidad ni persona.
- **Amnesia Parcial**, el individuo olvida un corto periodo de tiempo, desde un punto hacia atrás o adelante. Este tipo de amnesia se da con frecuencia después de ataques como la epilepsia o la histeria.
- **Amnesia Lagunar**, el afectado olvida lo que pasó antes de un hecho traumático, tomando solo episodios o periodos, y de acuerdo con el tipo de memoria que se implique, tendremos la distinción entre: anterógrada o retrógrada.

- Amnesia anterógrada, también llamada Amnesia de fijación, se refiere a la incapacidad para aprender **nueva información** tras la aparición del trastorno –normalmente orgánico que dio lugar a la amnesia. Olvida al mismo ritmo que se suceden los acontecimientos. Afectará por definición a la memoria de corto plazo, conservando no obstante los recuerdos anteriores a la enfermedad.
- Amnesia retrógrada es **el olvido de lo sucedido en el periodo previo** a la enfermedad. Es la afectación de la capacidad de evocar información y sucesos bien establecidos antes del inicio de la enfermedad.