

3.10. Infección de vías urinarias y embarazo.



- La infección urinaria es una de las complicaciones médicas más frecuentes del embarazo, la cual si no es diagnosticada y tratada de manera oportuna, conlleva a un incremento significativo en la morbilidad tanto en la madre como en el feto.



- **Infecciones del tracto urinario:** Existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas. Son clasificadas de diversas formas: alta o baja, aguda o crónica, no complicada o complicada, sintomática o asintomática, nueva o recurrente y comunitaria o nosocomial.



Infecciones del tracto urinario bajo: Colonización bacteriana a nivel de uretra y vejiga que normalmente se asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios, como urgencia, disuria, polaquiuria, turbidez y olor fétido de la orina. Incluye:

- **Bacteriuria asintomática:** Colonización de la orina por un mismo germen generalmente mayor que 100 000 UFC//mL de orina en dos o más muestras y en ausencia total de síntomas urinarios (Schneeberger C, 2015).



- **Cistitis aguda:** Infección bacteriana de la vejiga. Es causada por gérmenes, por lo regular bacterias que ingresan a la uretra y luego a la vejiga.
- **Cistouretritis aguda:** Es una infección del tracto urinario que se caracteriza por disuria, polaquiuria y en ocasiones tenesmo vesical. Se acompaña de bacteriuria entre 10^2 y 10^5 colonias/mL de orina.





- SIGNOS Y SINTOMAS
- Hipertermia
- Dolor al miccionar
- Hematuria
- Flujo vaginal
- Dolor tipo cólico u obstétrico
- Astenia, adinamia y anorexia
- Dolor renal
- Orina concentrada y con mal olor



DIAGNOSTICO

- HISTORIA CLINICA
- EXAMEN FISICO
- EGO
- USG

TRATAMIENTO

- AINES
- ANTIBIOTICOS
- REPOSO RELATIVO O ABSOLUTO
- VIGILANCIA DE PRESENCIA DE CONTRACCIONES UTERINAS
- CREMAS U OVULOS VAGINALES SI EXISTE FLUJO
- VIGILAR FCF
- CITA HABIERTA.