

PRODUCCION DE PIEL



PRODUCCION DE PIEL

En la crianza de conejos peleteros, la piel es el producto principal y la carne el producto secundario.

La crianza de conejos de piel requiere de muchos más conocimientos, cuidado y atención que la crianza de conejos para carne.

Por lo general se utiliza la raza Rex y las variedades creadas a partir del Rex, pues su piel es muy apreciada comercialmente.

Las pieles que se producen son de 3 clases: Blancas, Coloreadas de color uniforme y Manchadas.

Se puede comenzar la crianza con un lote inicial de ocho hembras y dos machos, ambos de raza pura.

A partir de ese momento, en base a un buen plan reproductivo y a una adecuada selección de futuros reproductores, podemos aumentar el número de animales de la granja, hasta llegar a niveles comerciales.

De entre todas las crias hembras que se vayan obteniendo, se irá seleccionando las más idóneas como futuras reproductoras, de acuerdo a ciertos criterios económicamente importantes.

A pesar que se puede utilizar la consanguinidad directa y colateral, es conveniente que los machos no provengan de la misma granja, si no que sean adquiridos en otros lugares de prestigio.



PARAMETROS PRODUCTIVOS

- Tasa de fertilidad : 90%.
- Gestación : 31 días.
- Lactación : 60 días.
- N° de crías/parto : 6 mínimo.
- N° de partos/ año :
4 (sistema de empadre pre- destete).
- Mortalidad : 10% en lactación.
5% en producción.
- N° de hembras por cada macho : 6.
- Tiempo de vida del conejo :
- 6 a 8 meses dependiendo de la raza.
- 15 a 18 meses en conejos Rex.

FACTORES A CONSIDERAR EN LA SELECCION DE CONEJOS DE PIEL**A. LOTE INICIAL:**

Los reproductores con los que vamos a comenzar la explotación, deben de ser adquiridos en granjas de prestigio, en donde se lleve un estricto record de todos los animales.

Un buen estado sanitario es indispensable:

Son signos externos de buen estado de salud, los ojos brillantes, la piel lisa y el temperamento vivaz.

Son signos de salud deficiente, los ojos opacos, los carrillos hundidos, el pelo rizado, el vientre hinchado y el temperamento deprimido.

No son deseables los animales nerviosos.

Deben excluirse de la función reproductiva los conejos con mal formaciones corporales tales como: dorso deprimido, mutilaciones de cualquier clase, anomalías dentarias, ceguera, etc.

B. LOTE EN SERVICIO:

- Número y peso de sus crías al nacimiento.
- Número de crías destetadas.
- Consumo de alimentos.
- Calidad y rendimiento de piel de sus camadas.
- Regularidad en la actividad reproductiva.
- Control estricto de genes letales y subletales.

**CICLO VITAL DEL CONEJO DE PIEL**

El ciclo vital del conejo de piel se divide en 3 periodos definidos:

- Lactancia; desde el nacimiento hasta los 60 días
- Post-destete; desde los 60 hasta los 120 días
- Producción; desde los 120 días hasta su sacrificio.

LACTANCIA:

El número ideal de gazapos que debe de criar una madre, es de cinco a seis; si la camada es más numerosa, se debe de utilizar una nodriza, de entre las conejas que acaban de parir y que tienen pocas crías.

El periodo de lactación en conejos de piel, es de ocho semanas.

Una semana antes del destete, la hembra será llevada para ser cubierta nuevamente por el macho.

El periodo de lactación, es el más delicado en la crianza de conejos y en donde se produce mayor mortalidad.

POST-DESTETE:

El destete para conejos de piel, es recomendable que se haga a los 2 meses, momento en el cual se puede Comenzar la selección de futuras hembras reproductoras que integrarán el plantel.

Asimismo, se hará la separación de los gazapos por sexo y la identificación de los animales, colocándose a los jóvenes en jaulas colectivas de 6 a 8 animales hasta que entren a su etapa de producción, momento en el cual se les colocará en jaulas individuales.

Mientras tanto, la madre se quedará en su jaula, para continuar con su función reproductiva.

**PRODUCCION:**


Los conejos, que ya estarán alojados en jaulas individuales, deberán estar protegidos a exposiciones prolongadas de los rayos solares, que pueden provocar mutaciones en los colores del manto. Lo más recomendable es que mantengamos a los conejos en lugares con sombra y bien ventilados.

Los machos castrados forman una piel más fina que los machos enteros, por lo que si se considera que la castración es económicamente justificada, esta debe de hacerse cuando el conejo tenga 3 ó 4 meses de edad.

Para prevenir el parasitismo externo y conservar la piel en buen estado, se debe de bañar a los productores una vez al mes y peinarlos una vez por semana.

Cuando el conejo llega a su madurez y su piel está en plenitud; ha llegado el momento de sacrificarlo y obtener la piel.

Antes de matar al conejo, debemos precaver que el conejo no este en "muda" (periodo de renovación de pelo viejo por nuevo que se presenta 2 veces por año), por que esa piel no tiene valor.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO REPRODUCTIVO DEL CONEJO DE PIEL


SISTEMA DE CRUZAMIENTO
EN CONEJOS DE PIEL

A. SERVICIO ENTRE UNA MISMA RAZA:

Es el sistema más recomendado. Ambos reproductores son de sangre pura.

Ejemplo:

- Macho Rex x Hembra Rex




Salen gazapos de raza Rex pura, de los cuales se seleccionarán los mejores como futuros reproductores; los demás entran al plantel productor.

B. SERVICIO SIMPLE ENTRE 2 RAZAS PURAS:

Este sistema se utiliza para unir características favorables de 2 razas puras distintas.

Ejemplo:

- Macho Rex x Hembra Chinchilla



Salen crías híbridos de la variedad Chinchilla x Rex.

DESUELLO

El desuello consiste en despojar la piel del animal sacrificado. De la forma o técnica empleada en el desuello, depende la calidad de la piel.

El desollado se realiza con el animal colgado de uno o de los dos miembros posteriores (preferentemente de los dos). Se corta las extremidades anteriores (manos) a la altura del codo, la cola y la cabeza.

Se inicia cortando la piel en forma circular a la altura de los corvejones (tobillos) y desde este punto, se desciende, separando la piel de las 2 patas hasta llegar al ano, obteniendo así una incisión en forma de V.

Con ayuda de los dedos, se desprende la piel alrededor de la cola, seccionando ésta para que no quede adherida a la piel.

Efectuada dicha tarea, la piel entera se da vuelta sobre el cuerpo y se tira hacia abajo.

Al llegar a las manos, se saca la piel por los orificios. Ahí termina la operación.

Procediendo de esta forma, obtendremos una piel íntegra en forma de bolsa o tubo, pero con el pelo hacia adentro.

Esta operación es muy sencilla, pero requiere de cierta práctica, por lo que al comienzo debe de ser realizada por una persona capacitada en el manejo del cuchillo para desollar.

Para evitar contaminación posterior, es necesario eliminar las partes que no interesan al curtidor, así como los restos de carne, grasas o sangre que causan putrefacción.

CONSERVACION DE LA PIEL

Después del desuello, si se deja la piel sin ningún tratamiento, esta entra en putrefacción por la humedad que presenta (60-70%), siendo un caldo de cultivo para las bacterias.

Por este motivo, es necesario que después del desuello, la piel se coloque en un lugar fresco y ventilado con el lado carne hacia arriba, hasta que se enfríe.

Después que las pieles estén frías, se procede a el descarnado y desangrado, que consiste en eliminar los restos de carne, tejidos adiposos o músculos que hubieran quedado después del desollado.

Posteriormente se hace el estaqueado, que consiste en extender la piel sobre un bastidor o sobre un gancho grueso, de madera o alambre, en forma de V o de U invertidas.

Estos bastidores o ganchos, deben de colocarse en un lugar seco, ventilado y libre de moscas para que sequen.

Luego se procede a un lavado superficial con una esponja,

Una piel limpia y colocada en el lugar apropiado, secará totalmente en 15 días como mínimo y en 30 días como máximo. En este periodo se debe vigilar que no haya vestigios de corrupción en ninguna piel; de haberla, la piel afectada debe de retirarse de inmediato y ser tratada en otro ambiente.

Cuando la piel ya está seca totalmente, debe ser sacada del gancho o bastidor, se le abra por la línea media del vientre y se le extenderá.

Las pieles abiertas se colocan una sobre otra y se colocan en cajones o sobre anaqueles, evitando la humedad y protegiéndolas con bolitas de naftalina.

