



Un reflejo es la respuesta simple y automática a un estimulo exterior.

 Primarios: están presentes desde el nacimiento y desaparecen progresivamente

•Secundarios: aparecen a lo largo de los primeros meses de vida.

REFELOS

- Reflejo de Galat
- Reflejo de Moro
- Reflejo de Babiski
- Reflejo de Búsqueda
- Reflejo de Succión

- Reflejo de Marca
- Reflejo de Presión Palmar
- Reflejo de Presión plantar
- Reflejo de Gateo
- Reflejo Tónico del cuello.



DE GALANT


Teniendo al bebé acostado boca abajo, al pasar el dedo sobre los riñones, en paralelo a la columna vertebral, el cuerpo de éste se arquea ligeramente hacia el lado estimulado.

DE MORO

Un ruido fuerte, súbito o la sensación de caer hacen que el bebé estire las piernas, los brazos y los dedos, arquea la espalda e inclina la cabeza hacia atrás, en seguida repliega los brazos sobre el pecho con los puños cerrados.

Duración: cuatro a seis meses.





DE BABINSKI

Cuando se le pasa suavemente la mano por la planta del pie desde el talón hasta el dedo gordo, levanta los dedos y voltea el pie hacia adentro.

Duración: entre seis meses y dos años, después de este tiempo, recoge los dedos hacia abajo.

DE BUSQUEDA

Si toca suavemente su mejilla, el bebé volteará la cabeza en dirección del estímulo con la boca abierta listo para succionar.

Duración: tres o cuatro meses aunque puede persistir cuando el niño duerme.





DE SUCCION

Si coloca algún objeto en su boca, por ejemplo el seno materno, este lo succionará.

Duración: tres o cuatro meses aunque puede persistir cuando el niño duerme.



DE LA MARCHA

Si le coloca en posición vertical sobre una mesa o sobre una superficie firme y plana, sostenido por las axilas, el bebé levanta primero una pierna y luego la otra como si quisiera dar unos pasos. Esto se observa mejor después del cuarto día de vida.

Duración: variable pero generalmente un mes.

DE LA PRESION PALMAR

El bebé acostado mirando hacia adelante con los brazos doblados, si se le coloca el dedo índice en la palma de la mano cierra la mano tratando de agarrarlo.

Duración: tres o cuatro meses.





DE LA PRESION PLANTAR

Coloque un dedo en la base de los pies, los dedos de los pies se flexionan hacia abajo

Duración: tres o cuatro meses.

El bebé acostado sobre el abdomen realiza movimientos de arrastre con los brazos y las piernas

Duración: uno o dos meses. **DE GATEO**





TONICO DEL CUELLO

Cuando el niño este dormido, girele la cabeza hacia un lado, la pierna y el brazo de ese mismo lado se extienden, el brazo y la pierna del lado opuesto se flexionan

Duración: tres o cuatro meses.



