

FORMULARIO Y USO DE LITERALES CON SU SIGNIFICADO

AGRUPACION DE DATOS

Rango (R) = Valor Máximo – Valor Mínimo

Número de intervalos o número de clases (k): Usar la regla de sturges

$$K = 1 + 3.322 \cdot \log n$$

Suponga que n = 30 datos por lo tanto harían lo siguiente:

$$\text{En la calculadora pone todo junto así: } 1 + (3.322 \times \log 30) = 5.9069 = 6$$

Recuerden que a partir del punto 5 se redondea al número que sigue y del punto 4 se redondea al número anterior. Por ejemplo:

$$5.9217 = 6$$

$$5.4517 = 5$$

Amplitud (A) = $\frac{R}{K}$ Es el rango entre el número de intervalos.

COMPLEMENTO DE LA TABLA DE FRECUENCIAS

M.C. = Marca de clase, algunos autores lo manifiestan como punto medio (P.M.) y otros simplemente con la letra X. Se obtiene al aplicar la siguiente formula:

Donde Li es el límite inferior y Ls es el límite superior.

$$\frac{Li + ls}{2}$$

f = Se trata de una f minúscula que significa Frecuencia absoluta o frecuencia real.

fr = Frecuencia relativa: Se obtiene al aplicar la siguiente formula:

$$fr = \frac{f}{n}$$

F = Se trata de una F mayúscula y significa frecuencia absoluta acumulada.

$$F = f + f \text{ siguiente}$$

n = Es el total de datos que tiene el ejercicio.

Para resolver los ejercicios tendrán que acceder al Link propuesto que viene en la parte inferior del presente archivo. De dicho video quiero aclarar lo siguiente:

22 19 16 13 18 15 20 14 15 16
 15 16 20 13 15 18 15 13 18 15

① R
 ② K INTERVALOS
 ③ A_i

$R = X_{MAX} - X_{MIN}$
 $= 22 - 13$
 $= 9$

$K \rightarrow$ REGLA DE STURGES
 $K = 1 + 3,322 \log 20$
 $= 5,32 \approx 5$

$6,32 \approx 7$

En la regla de sturges el autor manifiesta que es recomendable redondear de tal manera que siempre quede un número impar pero no es obligatorio dado que en este tipo de ejercicios no hay una regla universal. Para fines de nuestra actividad vamos a manejar los redondeos tal como los sabemos. Les muestro los siguientes **ejemplos:**

5.32 = Queda en 5

5.53 = Queda en 6

6.32 = Queda en 6

6.67 = Queda en 7

En estos redondeos no importa que sea par o impar ustedes manejaran los redondeos tal y como lo sabemos y como se los manifiesto en los ejemplos.

LINK DE TUTORIAL PROPUESTO

<https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7Gzohbl&t=308s>

EJERCICIO 1

Los siguientes datos representan el número de horas de sueño de 40 pacientes de un hospital como consecuencia de la administración de cierto anestésico. Con esos datos construya una tabla de distribución de frecuencias:

7	8	5	10	9	10	5	12	8	6
10	11	6	5	10	11	10	5	9	13
8	12	8	8	10	15	7	6	8	8
5	6	9	7	14	8	7	5	5	14

EJERCICIO 2

Los siguientes datos corresponden a la edad de 30 pacientes elegidos al azar quienes fueron ingresados al hospital en el transcurso de una semana. Agrupa los datos en intervalos y elabora la tabla de distribución de frecuencias.

15	38	14	13	29	25
20	13	16	32	44	39
45	46	19	23	24	18
19	20	21	18	25	33
13	18	22	24	27	27

NOTA: Cualquier operación matemática que dé como resultado un número con decimales siempre, usaran 4 decimales. ¡OJO! 4 decimales....

- Una vez terminado adjuntarlo en formato PDF, con su respectiva presentación.