


DISFAGIA



DEFINICION

La disfagia es la condición médica que causa dificultad o imposibilidad absoluta al momento de tragar alimentos sólidos y líquidos.

2 Tipos: La disfagia orofaríngea es la que se origina en la zona de la faringe y disfagia esofágica

DIAGNOSTICO

los rayos X, la endoscopia y la manometría. Durante los rayos X, el paciente debe ingerir una solución inofensiva de bario, que permitirá ver el movimiento de los fluidos dentro de la faringe y esófago

ETIOLOGIA Y PATOGÉNESIS

La disfagia puede derivar de causas neuromusculares o estructurales. Estos trastornos pueden producir estrechamiento del esófago, falta de secreción salival, debilidad de las estructuras musculares que impulsan el bolo alimentario hacia el estómago.

TRATAMIENTO

Antiácidos Bloqueadores H₂.
Inhibidores de la bomba de protones
Procinéticos Antibiótico

MANIFESTACIONES CLINICAS

dificultad para tragar alimentos sólidos y líquidos.

HERNIA HIATAL



DEFINICION

cuando la parte superior del estómago sobresale a través del músculo grande que separa el pecho del estómago. El diafragma tiene una pequeña abertura (el hiato) a través del cual pasa el tubo de alimentación (esófago) para unirse al estómago.

DIAGNOSTICO

Radiografía del aparato digestivo superior

ETIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS

Ardor de estómago. Regurgitación de comida o líquido a la boca. Retroceso de ácido estomacal al esófago (reflujo ácido) Dificultad para tragar. Dolor abdominal o en el pecho.

Una hernia hiatal se genera cuando el tejido muscular debilitado permite que el estómago forme una protuberancia a través del diafragma.


TRATAMIENTO

Las hernias de hiato pueden no requerir tratamiento. Algunas se tratan con fármacos. En casos extremos, la mayor parte del estómago se hernia hacia el tórax. Las hernias hiatales paraesofágicas grandes pueden requerir tratamiento quirúrgico.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Ardor de estómago. Regurgitación de comida o líquido a la boca. Retroceso de ácido estomacal al esófago Dificultad para tragar.

REFLUJO GASTRO ESOFAGICO



DEFINICION

Una enfermedad digestiva en la que el ácido o la bilis estomacal irrita el revestimiento del esófago.

Se trata de una enfermedad crónica que ocurre cuando el ácido estomacal o la bilis ascienden por el esófago, lo que irrita su revestimiento.

TRATAMIENTO

Antiácidos.
Bloqueadores H2.
Inhibidores de la bomba de protones.
Procinéticos.

ETIOLOGIA Y PATOGÉNESIS

Tiene etiología del frecuente reflujo de ácido.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Ardor en el pecho, que generalmente aparece después de comer y empeora al recostarse.

GASTRITIS



Gastritis

DEFINICION

Conjunto de trastornos caracterizados por la inflamación del revestimiento del estómago. Puede estar ocasionada por infecciones, lesiones, el uso frecuente de analgésicos llamados AINE y demasiado alcohol. Referencia a la inflamación de la mucosa gástrica..

DIAGNOSTICO

Uso de un endoscopio para examinar el aparato digestivo superior (endoscopia).
Radiografía del aparato digestivo superior

ETIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS

Infección del estómago con una bacteria llamada *Helicobacter pylori*.
AINES

TRATAMIENTO

- Antibióticos para eliminar el *Helicobacter pylori*. Si tienes *Helicobacter pylori* en el aparato digestivo, el médico podría recomendarte una combinación de antibióticos, como claritromicina (Biaxin) y amoxicilina (Amoxil, Augmentin, otros) o metronidazol (Flagyl), para eliminar la bacteria..
- Medicamentos para disminuir la producción de ácido.
- Antiácidos que neutralizan el ácido estomacal.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Dolor en la parte superior del vientre, náuseas y vómitos.

SINDROME DE INTESTINO

IRRITABLE



DEFINICION

Se caracteriza por una combinación variable de síntomas intestinales crónicos y recurrentes que no pueden explicarse a partir de anomalías estructurales o bioquímicas. Caracterizados por síntomas persistentes o recurrentes de dolor.

DIAGNOSTICO

El diagnóstico suele basarse en los signos y síntomas de dolor o malestar abdominal, distensión y estreñimiento o diarrea, o bien por episodios alternantes de estreñimiento y diarrea.

ETIOLOGIA Y PATOGÉNESIS

El síndrome del intestino irritable puede presentarse después de un episodio grave de diarrea (gastroenteritis) que se produce a causa de bacterias o de un virus. El síndrome del intestino irritable también puede asociarse con un exceso de bacterias en el intestino.

TRATAMIENTO

Evitar las sustancias lesivas mediante el seguimiento de dietas que eliminan los alimentos grasos y los que generan gases.
Antiespasmódicos y anticolinérgicos.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Diarrea o estreñimiento.
Las anomalías que se presentan durante la defecación (pujo, urgencia o tenesmo), la expulsión de moco y la distensión o sensación de distensión abdominal.



ENFERMEDAD

ULCEROSA PEPTICA



DEFINICION

es una erosión de un segmento de la mucosa digestiva, en general del estómago (úlceras gástricas) o de los primeros centímetros del duodeno

DIAGNOSTICO

Análisis de laboratorio para el H. pylori.
una endoscopia
Serie gastrointestinal superior. A veces se llama trago de bario a esta prueba, que es una serie de radiografías del aparato digestivo superior que crea imágenes del esófago.

ETIOLOGIA Y PATOGÉNESIS

Las causas más comunes de las úlceras pépticas son infección con la bacteria *Helicobacter pylori* (H. pylori) y el uso prolongado de aspirina


TRATAMIENTO

Medicamentos para disminuir la producción de ácido estomacal. Si una bacteria es la causa, es posible que se necesiten antibióticos.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Náuseas.
Vómitos.
Heces negras, alquitranosas o con sangre.
Dolor torácico.
Fatiga.
Vómitos, posiblemente con sangre.
Pérdida de peso.

ENFERMEDAD DIVERTICULAR



DEFINICIÓN

es un trastorno que se produce cuando se forman pequeñas bolsas o sacos que empujan hacia afuera a través de los puntos débiles de la pared de su colon.

DIAGNOSTICO

usando una tomografía computarizada (TC) de su abdomen y pelvis. Es mejor hacer la exploración con un contraste intravenoso (IV) cuando sea posible.

ETIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS

Los divertículos se suelen desarrollar cuando lugares naturalmente débiles en tu colon ceden bajo presión.

TRATAMIENTO

se debe tratar, inicialmente, mediante reposo en cama, dieta absoluta, hidratación intravenosa, analgésicos y antibióticos intravenosos.

Si hay signos de obstrucción intestinal (náuseas, vómitos y marcada distensión abdominal), se colocará una sonda nasogástrica para descomprimir el intestino.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Náuseas y vómitos.
Fiebre.
Sensibilidad abdominal.
Estreñimiento o, con menos frecuencia, diarrea.

