

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MEDICO:

DR. MIGUEL VACILIO ROBLEDO

MATERIA:

FISIOPATOLOGÍA

TRABAJO:

ESQUEMA DE LA OBESIDAD

CARRERA:

MEDECINA GENERAL

ALUMNO:

CELSO FABIAN BARRIOS MÉNDEZ

GRADO:

2DO SEMESTRE

TAPACHULA, CHIAPAS

OBESIDAD

DESEQUILIBRIO ENERGÉTICO

Sobrepeso, obesidad con demasiadas calorías

TIPOS DE OBESIDAD

Parte superior del cuerpo se denomina entral, abdominal, visceral o patron masculino.

Parte inferior es conocido como periférica, gluteofemoral o femenina

PREVENCIÓN

Actividad física, disminución del tiempo frente a la pantalla.

TRATAMIENTO

Actividad física y dieta baja en grasas.

DESNUTRICIÓN E INANICIÓN

DESNUTRICIÓN

Persona que recibe una cantidad adecuada de ntrimentos para su función corporal

DESNUTRICIÓN PROTEICOCALÓRICA

Dsnutrición de proteínas y energia que presenta una disminución de los tejidos.

MARASMO

Pérdida progresiva de la masa muscular y de las reservas de grasa por un consumo inadecuado de alimentos de ineficiencias de calorías y protenias.

DIAGNOSTICO

Valorción nutricional, evaluación del consumo dietético, medicones, exploración clínica, pruebas de laboratorio.

TRATAMIENTO

Cantidades deproteínas y calorías, Vitaminas y minerales

TRANSTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN

Tienen mayor prevalencia en sociedades industrializadas en grupos socioeconomicos y etnicos mayores.

ANOREXIA NERVIOSA

AN transtorno de la alimentación que suele comenzar durante la adolescencia.

COMPLICACIONES

La anorexia es la amenorrea y la pérdida de las características sexuales secundarias.

TRATAMIENTO

Renunciar e ingerir alimentos y rituales sobre la comida, el consumo de purgas y laxantes.

BULIMIA NERVIOSA

CAUSAS

Vomitare, ayunar, realizar ejercicio excesivo, utilizar diuréticos, laxantes o enemas.

CRITERIOS

Vómito autoinducido, consumo excesivo de laxantes . transtorno de alimentación no ocurre de manera exclusiva.

COMPLICACIONES

Transtornos dentales, parotiditis, anomalias de los líquidos y los electrolitos. Esofagitis, disfagia y estenosis esofágicas.

TRATAMIENTO

Terapia cognitiva-conductual y terapias interpersonal.

TRANSTORNO EN ATRACCIONES

TCA es caracterizada por episodios recurrentes de limentación. Consumo con rapidez, sensación incomoda de plenitud. presencia de turbación.