



**NOMBRE DEL CATEDRATICO: DRA. MONICA GORDILLO RENDON**

**NOMBRE DE LA ALUMNA: LAURA DILERY CRUZ DIAZ**

**MATERIA: REHABILITACIÓN**

**TEMA: CUADRO SINOPTICO DERMATOSIS PROFESIONAL**

**GRADO Y GRUPO: 5° “A”**

**FECHA DE ENTREGA: 19-JUNIO -2020**



## DERMATOSIS PROFESIONAL

### DERMATITIS POR CONTACTO IRRITATIVA

Es la dermatosis ocupacional más frecuente y se define por la presencia de un cuadro dérmico inflamatorio causado por el contacto con sustancias químicas llamadas contactantes.

Su morfología varía según la duración de la enfermedad y la zona afectada.

Participarían mediadores inflamatorios tipo factor de necrosis tumoral alfa

Se presenta típicamente eczematosas, lo que significa que presenta lesiones eritematosas (rojas o rosadas) planas o elevadas cubiertas con costras o escamas, pudiendo agregarse liquenificación fisuración de grado variable, desde muy superficial hasta profunda.

### GRUPOS AFECTADOS

- \*Amas de casa
- \*Ganadería
- \*Limpieza
- \*Guardería
- \*Construcción
- \*Peluquería
- \*Mecánica de motores
- \*Ingeniería(aceites de corte)
- \*Jardinería y horticultura
- Granjería

### DERMATITIS POR CONTACTO ALERGICA

Se presenta en individuos predisuestos por una respuesta inmune celular retardada (tipo IV) después de un tiempo variable de sensibilización a la sustancia causante llamada alérgeno.

Se presenta generalmente como una dermatitis eczematosa con eritema, descamación, costras, fisuras, en ocasiones vesículas o hiperqueratosis, y no muestra la variación clínica que se puede encontrar en la dermatitis irritativa.

### GRUPOS AFECTADOS

- \*Amas de casa
- \*Ganadería
- \*Limpieza
- \*Guardería
- \*Construcción
- \*Peluquería
- \*Mecánica de motores
- \*Ingeniería(aceites de corte)
- \*Jardinería y horticultura
- Granjería