



**Nombre de alumno: Axel Rodrigo
Hernández**

**Nombre del profesor: Gladys Elena
Gordillo Aguilar**

**Nombre del trabajo:
cuadros clínicos**

Materia:

microbiología y parasitología

Grado: 2do.

Grupo: A

Puede desarrollarse a cualquier edad, pero es más habitual en niños y adultos jóvenes, especialmente en los varones. A diferencia de otros linfomas, tiene una distribución geográfica específica: es muy frecuente en África Central y muy raro en Estados Unidos. La infección por el virus de Epstein-Barr se asocia con el linfoma de Burkitt. También es más frecuente en las personas con infección por el VIH.

El LB se puede notar inicialmente como una inflamación de los ganglios linfáticos (glándulas) en la cabeza y cuello. Estos ganglios linfáticos inflamados frecuentemente son indoloros, pero pueden crecer muy rápidamente.

En los tipos comunmente vistos en los Estados Unidos, el cáncer a menudo comienza en el área del vientre (abdomen). La enfermedad también puede iniciar en los ovarios, los testículos, el cerebro, los riñones, el hígado y el líquido cefalorraquídeo.

- Otros cuadros clínicos
- Fiebre
- Sudoración nocturna
- Pérdida de peso inexplicable
-

Por lo general, la leucoplasia se presenta en las encías, el interior de las mejillas, la parte inferior de la boca (debajo de la lengua) y, a veces, en la lengua. No suele ser dolorosa y puede pasar desapercibida durante un tiempo.

La leucoplasia puede presentarse:

- Como parches blancos o grisáceos que no desaparecen al limpiar la zona
- Con textura plana o irregular
- Como zonas engrosadas o endurecidas

- Junto con lesiones rojas y abultadas (leucoplasia moteada o eritroplasia), las cuales tienen más probabilidades de mostrar cambios precancerígenos
- Linfoma de linfocitos b malignos
 - requiere diagnóstico médico
 - Los síntomas incluyen inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre, dolor de vientre o dolor en el pecho.
 - Las personas pueden sufrir:
 - Áreas de dolor: abdomen
 - Todo el cuerpo: anemia, fatiga, pérdida de apetito o sudores nocturnos
 - También comunes: ganglios linfáticos inflamados, pérdida de peso o síntomas b

Cuadro clínico del linfoma no hodgkiniano:

- Hinchazón sin dolor de los ganglios linfáticos del cuello, de las axilas o de la ingle
- Hinchazón o dolor abdominal
- Dolor en el pecho, tos o dificultad para respirar
- Fatiga persistente
- Fiebre
- Sudoraciones nocturnas
- Adelgazamiento sin causa aparente
- Cáncer nasofaríngeo
- Otros síntomas son
 - dolor de oído
 - , rinorrea sanguinolenta y purulenta,
 - epistaxis franca
 - , parálisis de los nervios craneales
 - y adenopatía cervical.
- La parálisis de los pares craneales afecta sobre todo al VI, IV y III par, debido a su localización en el seno cavernoso, en estrecha proximidad al

foramen lacerum, que es la vía más común de diseminación intracraneal para estos tumores. Dado que los linfáticos de la nasofaringe se comunican en la línea media, son frecuentes las metástasis bilaterales.

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/non-hodgkins-lymphoma/symptoms-causes/syc-20375680>

<https://www.medigraphic.com/pdfs/sanmil/sm-2012/sm126f.pdf>

<https://www.google.com/search?q=leucoplasia+vellosa+oral&oq=leucoplaquica&aqs=chrome.3.69i57j0l7.20505j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://www.msdmanuals.com/es-mx/hogar/trastornos-otorrinolaringol%C3%B3gicos/c%C3%A1ncer-de-boca,-nariz-y-faringe/c%C3%A1ncer-de-la-nasofaringe>

<https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-nasofaringe/si-usted-tiene-cancer-de-nasofaringe.html#:~:text=El%20c%C3%A1ncer%20nasofar%C3%ADgeo%20es%20un,comienzan%20a%20crecer%20sin%20control.>