


## Hematoma Subdural




Este hematoma se ubica entre la duramadre y la aracnoides.

Puede ser agudo, subagudo o crónico, dependiendo del tiempo de evolución.

El tratamiento del hematoma subdural varía dependiendo de la amplitud del mismo, pudiendo realizarse cirugía o seguimiento médico.

La mortalidad oscila entre un 50 y un 90% según la oportunidad de la cirugía.

## Hematoma Epidural



Este hematoma se ubica entre el cráneo y la duramadre aunque puede aparecer también en la columna vertebral.

En su mayoría es agudo, ya que, sus síntomas se presentan de forma inmediata a la lesión.

El tratamiento del hematoma epidural es la cirugía de emergencia (craneotomía o craniectomía).

La mortalidad es de un 20% hasta un 55%, según la oportunidad de la cirugía.

## Hemorragia Subaracnoidea



Una hemorragia subaracnoidea es una hemorragia dentro del espacio subaracnoideo, comprendido entre la piamadre y aracnoides del tejido que recubre las meninges.

cuadro clínico; una cefalea súbita. se acompaña de vómito y pérdida de la conciencia

El tx. depende del estado de gravedad del paciente. La atención hospitalaria es necesaria para brindar cuidados de apoyo, detener el sangrado y limitar el daño cerebral. El tratamiento puede incluir cirugía y terapia intravenosa.

el 12% de los px. que la sufren no son adecuadamente diagnosticados o mueren antes de llegar al hospital y el 30% de los px. que llegan vivos al hospital fallecen en los primeros días

---

---

