



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Presentan

José Lenin Quiñones López

6to semestre, grupo "B"

Docente:

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Materia:

NEUROLOGIA

Comitán de Domínguez, Chiapas, 04/07/ 2020

GUILLAIN-BARRE

Esta es un síndrome poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca los nervios. Los primeros síntomas deben ser debilidad y hormigueo en las extremidades.

Estas sensaciones pueden propagarse rápidamente y eventualmente paralizar todo el cuerpo. En su forma más grave el Guillain-Barre es una emergencia médica. Los signos y síntomas incluyen sensación de hormigueo y picazón en los dedos de la mano, los pies, los tobillos o los muñecas, debilidad en las piernas que se extiende a la parte superior del cuerpo, marcha inestable o incapacidad para caminar o subir escaleras, dificultad

Tipos de sí de Guillain-Barre.

- > Polirradicular neuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (AIDP); es la forma más común en los EE.UU. Su signo más común es la debilidad muscular.
- > Síndrome de Miller Fisher; en el cual la parálisis comienza en el ojo; la cual se asocia a una marcha inestable.
- > La neuropatía axonal motora aguda.

Su diagnóstico se realiza mediante punción lumbar; electro miografía, Estudio de conducción nerviosa.

Se trata como tal esta enfocado en los síntomas ya que no hay cura; pero si se recomienda plasmaferesis, terapia de inmunoglobulina; enfocarse en aliviar el dolor, terapia física como movimiento de extremidades, para mantener los músculos.