



# Universidad del Sureste

## Escuela de Medicina

Presentan

José Lenin Quiñones López

6to semestre, grupo "B"

Docente:

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Materia:

NEUROLOGIA

Comitán de Domínguez, Chiapas, 04/07/ 2020

# POLINEUROPATIA INFLAMATORIA CRÓNICA.

Es una forma de polineuropatía que, como el síndrome de Guillain-Barré, provoca debilidad muscular que evoluciona más de 8 semanas. Se cree que esta tiene su origen en una reacción autoinmunitaria que daña la vaina de mielina que envuelve los nervios. En este trastorno, la debilidad empeora de forma continua durante un periodo de 8 semanas.

La electro-miografía, los estudios de conducción nerviosa y el análisis de líquido cefalorraquídeo ayudan a confirmar el diagnóstico.

Los síntomas de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica son similares a los del síndrome de Guillain-Barré: que son debilidad y sensación anormal como entumecimiento, sensación de hormigueo y pinchazos; posterior a los 3-4 semanas y en general los reflejos están ausentes.

En la mayoría de las personas con esta enfermedad la presión arterial fluctúa menos, los arritmias son menos frecuentes y otras funciones internas están menos alteradas. Además, la debilidad es más irregular, afecta los dos lados del cuerpo de forma diferente y puede progresar con lentitud.

El tratamiento puede consistir en corticosteroides u otros fármacos que inhiben el sistema inmunológico y a veces inmunoglobulinas y recambio de plasma.