



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

Presenta: Mayra Mercedes Lopez Morales

MATERIA: enfermedades infecciosas

Semestre: 6°

Grupo: "B"

Docente: Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Comitán de Domínguez, Chiapas

mayo del 2020

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

ENFERMEDAD GONOCOCICA

<p>* Agente.-</p> <p style="text-align: center;">Neisseria gonorrhoeae</p> <p>* Huésped.-</p> <p style="text-align: center;">humano</p> <p>* Medio ambiente.-</p> <p style="text-align: center;">-zonas urbanas -educación baja -Socioeconómica inferior</p>	Etapa Clínica				
	Signos y síntomas inespecíficos.-	Síntomas específicos.-	Complicaciones.-	Secuelas.-	Muerte.-
	Malestar general, fiebre, mareos, dolor	-disuria, poliuria, dispareuria, prurito, inflamación EPI	Absceso, infección gonocócica diseminada, embarazo ectópico	Infertilidad uretritis en hombres dolor pélvico crónico en mujeres	
	Etapa subclínica				
	Periodo de incubación: de 2 a 3 días				
Periodo prepatogénico		Periodo patogénico			
Prevención primaria		Prevención secundaria			Prevención terciaria
Promoción de la salud.-	Protección específica.-	Diagnóstico y tratamiento oportuno.-	Limitación de la incapacidad.-		Rehabilitación.-
información adecuada, para la prevención y educación sexual para la población	Dar a conocer el uso del condón, higiene en área genital, evitar diseminación	EGO, Citología, examen pélvico, antibióticos ceftriaxona, cefixima, levofloxacin	Abstinencia, tratamiento a compañeros sexuales, condón		Terapias con asesorías de personal médico y familiares

Nota.-

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

CLAMIDIA

<p>* Agente.-</p> <p style="text-align: center;">Chlamydia trachomatis</p> <p>* Huésped.-</p> <p style="text-align: center;">VSA, Homosexuales, Recién nacidos</p> <p>* Medio ambiente.-</p> <p style="text-align: center;">Economía baja Falta de accesos a servicio de salud</p>	Etapa Clínica				
	Signos y síntomas inespecíficos.-	Síntomas específicos.-	Complicaciones.-	Secuelas.-	Muerte.-
	Malestar general, fiebre, cefalea, dolor de estomago	Endometritis, salpingitis, EPI, infertilidad	Infección en el epidídimo comprometiendo testículos	Infertilidad, coma	
	Etapa subclínica				
	Periodo de incubación: de 5 a 21 días				
Periodo prepatogénico		Periodo patogénico			
Prevención primaria		Prevención secundaria			Prevención terciaria
Promoción de la salud.-	Protección específica.-	Diagnóstico y tratamiento oportuno.-	Limitación de la incapacidad.-		Rehabilitación.-
información adecuada, para la prevención y educación sexual para la población	Dar a conocer el uso del condón, higiene en área genital, evitar diseminación	Tinción de muestra de exudados, cultivo celular, ATB doxiciclina	Abstinencia, tratamiento a compañeros sexuales, condón		Terapias con asesorías de personal médico y familiares

Nota.-