



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Título del trabajo:

Historia Natural de la Enfermedad

Nombre del alumno: Nancy Carolina Guzmán Santiz.

Nombre de la asignatura: Infectología

Semestre y grupo: Sexto Semestre Grupo B

Nombre del profesor: Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Comitán de Domínguez, Chiapas. Mayo 2020

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD DE **GONORREA**

PERIODO PREPATOGENICO		PERIODO PATOGENICO			
<p style="text-align: center;">TRIADA ECOLÓGICA</p> <p>AGENTE: Brucella Melitensis, B. Abortus, B. Suis, B. Canis. Infectividad: Coco bacilo, intracelular, gram negativa.</p> <p>HUÉSPED: Afecta principalmente a sexo femenino (15-50 años)</p> <p>MEDIO AMBIENTE: Zonas tropicales: Bovinos, zonas semidesérticas: caprinos, movilización de ganado y sus productos.</p>		<p style="text-align: center;">HORIZONTE CLINICO</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">MUERTE</div>	ETAPA SUBCLINICA	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SECUELAS</div>	<p>Principalmente produce daño en el sistema reticulo-endotelial produciéndose una hiperplasia, focos granulomatosos y necrosis, aunque también pueden ocurrir en bazo, hígado y el sistema linfático</p>		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">COMPLICACIONES</div>	<p>Artritis, encefalitis, meningitis, orquiepidimitis, uretritis, neumonías, conjuntivitis, hepatitis, endocarditis</p>		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SIGNOS Y SINTOMAS ESPECIFICOS:</div>	<p>Fatiga, depresión, neurosis, mioaltralgias</p>		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SIGNOS Y SINTOMAS INESPECIFICOS:</div>	<p>Fiebre, cefalea, calosfríos, astena, adinamia, mialgias, altralgias, diaforesis, hipoxemia, hepatoespleñomegalia</p>		
		<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">HORIZONTE SUBCLINICO</p>			ETAPA CLINICA
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 0 auto; width: 200px;">PUERTA DE ENTRADA</div>		<p>Digestivo, conjuntivas, soluciones de continuidad, nódulos regionales.</p>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 0 auto; width: 200px;">PERIODO DE INCUBACION</div>		<p>1 a 3 semanas</p>			
PREVENCION PRIMARIA		PREVENCION SECUNDARIA		PREVENCION TERCARIA	
Promoción a la salud	Protección específica	Diagnostico precoz	Tratamiento Oportuno	Rehabilitación	
Mejoramento de habitos de consumo de lácteos Programas de prevención en	Vacunacion ganado Modificacon de ambiente laboral Pasteurizacion de leche	Signos y síntomas Epidemiologia Laboratorio: Rosa de Bengala	Esquema A: Tetraciclina – estreptomocina Esquema B: Rifampicina – TMP Esquema C: Doxiciclina – Rifampicina	Terapia física Fisioterapia Psicoterapia	

salud animal
Adecuada higiene
personal

SAT
2ME
Cultivo

--

--

--

--