



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Título del trabajo:

Historias naturales de Enfermedad Gonocócica y  
Chlamydia Trachomatis.

Nombre del alumno: Cristian Jonathan Aguilar Ocampo


Nombre de la asignatura: Enfermedades infecciosas

Semestre y grupo: Sexto semestre grupo A

Nombre del profesor: Dr. Cancino Gordillo Gerardo.

Lugar y fecha: Comitán de Domínguez Chiapas a 31 de Mayo del 2020.

## CADENA DE ENFERMEDAD GONOCÓCICA.




### PATOENIA, CUADRO CLINICO, DX Y TRATAMIENTO.

**Cuadro clínico:** En hombres se presenta una secreción o flujo del pene de color blanquecino o amarillento, además de disuria por uretritis aguda, en la mujer Cervicitis gonocócica sangrado al tener relaciones sexuales, disuria, dispareunia, descarga vaginal amarillenta con sangre, dolor en el abdomen bajo, fiebre, en casos de infección rectal se presenta: flujo rectal, dolor al defecar, ardor rectal, prurito rectal, tenesmo, secreción rectal purulenta sangre en la excreta, en boca y garganta faringitis


**DX:** Clínico y de laboratorio: Tinción de Gram de un amuestra de la uretra o del cuello del útero y secreción uretral del hombre también cultivo Agar sangre Agar de Thayer- Martin, exudado faríngeo, hemocultivo.

**TX:** Antibióticos regímenes de primera línea: Ceftriaxona 125mg IM dosis única o Cefixima 400mg V.O dosis única, y puede utilizarse Doxiciclina 100mg V.O c/d12hrs por 7 días, en embarazada Eritromicina 500mg V.O c/d 6 hrs por 7 días.

# Historia Natural de la enfermedad (Gonorrea)



## CADENA DE INFECCION DE CLAMIDIA



### PATOENIA, CUADRO CLINICO, DX Y TRATAMIENTO.

**Cuadro clínico:** en la mujer. Flujo vaginal anormal, disuria, dolor en el vientre, nausea, sangrado en los periodos menstruales, fiebre dispareunia, en hombres secreción del pene, disuria, ardor o picazón en el pene, dolor o inflamación en los testículos. Si la enfermedad no es tratada en la mujer puede afectar al útero y trompas de Falopio, causando complicaciones como: dolor pélvico crónico, infertilidad, embarazo ectópico, conjuntivitis por clamidia. En algunos es asintomático.

**DX:** Clínico pruebas como: por hisopado Cultivo, PCR, VSG, inmunofluorecencia, EGO, hemograma completo.

**TX:** antibiótico como: en etapa primaria y secundaria Doxiciclina 100mg/2veces al día durante 14 días, tratamiento habitual en una infección de clamidia: Azitromicina 1gr en dosis única, Doxiciclina 100mg/cd 12hrs por 7 días. Eritromicina 500mg c/6 hrs por 14 días, y como alternativa puede utilizarse tetraciclina 500mg c/6hras por 14 días.

# Historia Natural de la enfermedad Clamidia)

