



**Universidad del Sureste
Escuela de Medicina Humana**

“Resúmenes Cuarta Unidad”

Doctor: José Luis Gordillo Guillen

Presenta:

Cano Hernández Luis David

6 B

Materia: Neurología

"Síndrome de Guillain - Barré"

El Síndrome de Guillain - Barré o polirradiculoneuritis aguda es una enfermedad autoinmune desencadenada por una infección viral o bacteriana. Se caracteriza por una debilidad simétrica, rápidamente progresiva, de comienzo distal y avanza proximal, a veces llegando a afectar la musculatura bulbar respiratoria, y que cursa con pérdida de reflejos osteotendinosos y con signos sensitivos leves o ausentes.

El LCR muestra una disociación albúmino - citológica, con aumento de proteínas y normalidad celular.

Es la causa más frecuente de parálisis neuromuscular aguda, con incidencia de 1.3 a 2 por 100,000 y su mortalidad alcanza el 5-15%.

- Criterio Requerido Para El Diagnóstico -

- A. Debilidad progresiva en más de un miembro.
El grado de afectación es muy variable, desde mínima debilidad en las piernas, con o sin ataxia, a parálisis total de las 4 extremidades.
- B. Arreflexia osteotendinosa univocal.
Puede aceptarse una anestesia distal e hiperreflexia bicipital y patelar si se cumple el resto de los criterios.

Criterio De Desmielinización (Delanoe y cols).

1. Reducción de la velocidad de conducción motora.
2. Bloqueo parcial de la conducción.
3. Dispersión temporal.
4. Latencias distales motoras prolongadas.
5. Ausencia de ondas F o aumento de las latencias.
6. Velocidad de conducción sensitiva.