



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



RESUMEN

Presenta: Adriana Bermúdez Avendaño

Materia: Neurología

Grado: 6to

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 03 de junio del 2020.



Día / Mes / Año

Poli. neuropatía progresiva crónica

Es una enfermedad sensoriomotora simétrica monofásica progresiva o recurrente, caracterizada por debilidad muscular progresiva con sensaciones alteradas, reflejos tendinosos ausentes o disminuidos y un nivel elevado de proteínas en el líquido cefalorraquídeo.

Puede iniciarse a cualquier edad pero es más común en la 5^o y 6^o década de la vida.

Las principales manifestaciones clínicas incluyen debilidad progresiva simétrica de los músculos proximales y distales de las extremidades superiores e inferiores asociadas a aumento o disminución de los reflejos osteotendinosos.

El curso de la enfermedad es recurrente en el 30% de los casos, crónica y progresiva en el 60% y monofásica con recuperación general completa y permanente en el 10% de los casos.

La CIDP puede ser producida por una reacción inmune, resultante en desmielinización segmentaria y multifocal que puede conducir a una pérdida axonal a largo plazo.

Se han descrito componentes humorales y celulares con una producción de citocinas e interleucinas proinflamatorias las que permeabilizan la barrera hemato-nerviosa.

Actualmente las terapias de primera línea para el manejo son inmunoglobulina intravenosa, corticoides y plasmáferesis.

elevit

Vaginal

