



**Universidad del Sureste**

**Escuela de Medicina**

**“Resumen Miastenia“**

**Presenta: Khalia Alejandría Morales Walter.**

**Nombre de la asignatura: Neurología**

**Semestre y grupo: 6to B**

**Nombre del profesor: Jose Luis Gordillo Guillén.**

**Comitán de Domínguez, Chiapas a 10 de Marzo del 2020.**

# Miastenia Gravis

Es un trastorno neurológico caracterizado por debilidad progresiva y función sensorial alterada en las piernas y los brazos. El trastorno, que en ocasiones se denomina polineuropatía crónica recurrente, es causado por daño de la vaina de mielina de los nervios periféricos. Aunque se puede presentar a cualquier edad y en ambos sexos, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica es más común en adultos jóvenes y en hombres más que en mujeres.

A menudo se presenta con síntomas que incluyen hormigueo o adormecimiento (que comienza en los dedos de los pies y de las manos), debilidad de las piernas y de los brazos, pérdida de los reflejos profundos de los tendones (arreflexia), fatiga y sensaciones anormales. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica está estrechamente relacionada con el síndrome de Guillain Barre y se considera la contraparte crónica de esa enfermedad aguda.

El tratamiento para la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica incluye corticosteroides como la prednisona, la misma que puede prescribirse sola o en combinación con medicamentos inmunodepresores.

La plasmaféresis (intercambio plasmático) y la terapia con inmunoglobulina intravenosa (IgIV) son eficaces.