



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



RESUMEN

Presenta: Adriana Bermúdez Avendaño

Materia: Neurología

Grado: 6to

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 03 de junio del 2020.



Día / Mes / Año

Miastenia gravis

La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que se produce por un bloqueo postsináptico de la placa mioneuronal, a través de anticuerpos que se unen a los receptores de acetilcolina o a las moléculas de la membrana postsináptica.

Es una entidad rara que puede aparecer más frecuentemente en dos etapas de la vida, entre la segunda y tercera etapas de la vida.

Existen tres mecanismos mediante los cuales ocurre la entidad:

- 1.- Por una degradación acelerada de los receptores de acetilcolina.
- 2.- Por un bloqueo de los receptores mediados por anticuerpos.
- 3.- Por un daño secundario a la unión neuromuscular.

El diagnóstico depende de las pruebas clínicas como serológicas.

Existen dos formas clínicas de la miastenia gravis:
MG ocular: la debilidad se limita a los párpados y músculos extraoculares.

MG generalizada: la debilidad afecta tanto a los músculos oculares como a las funciones bulbares (manifiestación, disurtria, disfagia), de los miembros o músculos respiratorios.
Las pruebas del Tensilon y del paquete al resultado Anticuerpos AChR y/o musk presentes.

Citracal

Berocca

RedoxonTM Plus
Vitamine C + Zinc

