

Diagnostico de la quemadura	Tratamiento	
	Prehospitalario	Hospitalario
Leve + Menor al 2% ó Máximo 10% + Herida superficial	1= Quitar - la ropa 2= Aplicar agua con temperatura de 8°C sin follar. 3= Antisepsia, cambios de apósitos, vendajes y vigilar la evolución hasta el cierre.	
Moderada + 2-10% extensión + 1er y 2do grado con extensión 10-20% + Adolescentes 15-25%	1= Quitar ropa 2= Aplicar agua 7-8°C sin follar 3= Apoyo vital básico ABC * Lesión térmica por inhalación: se pondrá intubación orotraqueal * Intoxicación monóxido de carbono se administrará oxígeno 100% * No hay alteración vía respiratoria administración de oxígeno Fio2 mínimo	
Grave + Mas 20% extensión + Adolescentes 25%	4= Vía de acceso periférica o infusión líquidos * Durante el traslado máximo 1 hora se administrará solución Hartmann - Menores 2 años = 150-200 ml/h. - Mayores 2 años = 200-250 ml/h.	1= Reposición hídrica con fórmula Parkland 2= Cuidado herida - Lavar herida antiséptico - Aplicación ATB y vendajes se cambiara 2 veces al día.

Formula Parkland

Día 1 -	3ml/Kg/%Q de solución de Hartmann 100 ml/Kg de solución glucosada al 5%
Día 2 -	2.25ml/Kg/%Q de solución Hartmann 75ml/Kg de solución glucosada al 5%

Diana Monserrat Espinosa Espinosa 6^oD