



# Universidad del Sureste

## Medicina Humana

Diagnóstico diferencial entre “Dengue, Zika y Chikungunya”

Ana Ingrid Gordillo Mollinedo

Nombre de la asignatura: Enfermedades Infecciosas

Semestre y grupo: 6°B

Docente: Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 27 de junio de 2020.

| <b>DENGUE</b>  | <b>ZIKA</b>   | <b>CHIKUNGUNYA</b>   |
|--|---|--|
| Tras la picadura los síntomas aparecen de 3 a 7 días después.                          | Tras la picadura los síntomas aparecen de 3 a 7 días después. | Tras la picadura los síntomas aparecen de 3 a 7 días después.              |
| Fiebre alta (40°C).  | Fiebre alta (40°C).   | Fiebre alta (40°C).  |
| Cefalea intensa  | Cefalea   | Cefalea  |
| Sensación de cansancio   | Sensación de cansancio  | Malestar general   |
| Malestar general   | Malestar general  | Diarrea  |
| vómitos  | Náuseas   | Vómito   |
| Mialgias   | Mialgias  | Mialgias   |
| Artralgias   | Artralgias  | Artralgias   |
| Parches de sangre debajo de la dermis (dengue con datos de alarma)                     | Manchas rojas o puntos rojos en la piel y dan picazón         | Artritis   |
| Disminución del apetito  | Artritis  | Conjuntivitis no purulenta   |
| Dolor alrededor de los ojos y retro globular   | <b>Tratamiento: sintomático</b>                               | Erupciones en la dermis con puntos rojos y blancos                         |
| Sudoración   |   | Falta de apetito   |
| <b>Tratamiento: analgésicos, paracetamol e hidratación oral.</b>                       |   | Dolor retro globular   |
| En casos de alarma administración de líquidos vía venosa y transfusiones plaquetarias. |   | Dolor abdominal  |
|  |   | <b>Tratamiento: Reposo, hidratación, analgésicos para control de dolor</b> |