



# Universidad del Sureste

## Escuela de Medicina

“fiebre manchada”

Presenta la alumna:

María de Jesús Peñaloza Landa

6to semestre grupo B

Docente: Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Materia: enfermedades infecciosas

Comitán de Domínguez, Chiapas, 13 de junio de 2020

# Historia natural de la enfermedad: fiebre manchada

Triada ecológica		Horizonte clínico						
<p><b>Agente</b></p> <p>Rickettsias: tipo de bacteria que puede vivir solo dentro de las células otro organismo (transmitida por la garrapata café)</p> <p><b>Huésped.</b></p> <p>El ser humano, en todas las edades, principalmente aquellas que hayan sido picadas por una garrapata.</p> <p><b>M.A</b></p> <p>Es más frecuente en la temporada de marzo a septiembre, y en zonas boscosas.</p>								
						Recuperación/ muerte	Se requiere tratamiento rápido y si no se trata puede llegar a muerte.	
					secuela	Coma, EVC, lesión cardíaca.		
				complicación	Insomnio, delirios, coagulación intravascular diseminada.			
		Signos y síntomas	Cefalea, escalofríos, mialgias, mal estado general, tos seca, fiebre alta, erupción cutánea en muñecas, palmas, tobillos y plantas (inicialmente) luego se extiende a cuello, cara, axilas, nalga y tronco. La erupción es color rosa y no causa dolor, con forme avanza va cambiando a tonalidades más oscuras.					
		Contagio	Se transmiten a los humanos por medio de la picadura de una garrapata café, ya sea de bosque o de perro. Las rickettsias se multiplican en las células que envuelven a los vasos sanguíneos.					
Prevención primaria		Prevención secundaria			Prevención terciaria			
Promoción a la salud	Protección específica	Diagnostico Precoz	Tratamiento oportuno	Limitación del daño	Rehabilitación			
<b>Informar a las personas sobre la enfermedad que pueden transmitir las garrapatas, y principalmente si viven en zonas boscosas.</b>	Se limita la picadura de garrapatas al cubrirse bien, usar pantalón, camisa y botas. Se puede usar un repelente contra garrapatas, uso de permetrina en la ropa. Búsqueda constante de garrapatas sobre la piel o en la ropa.	Se hace con la clínica, por los síntomas y que esté asociado a una picadura de garrapata, se confirma mediante una biopsia por fluorescencia de la úlcera cutánea.	Ante la sospecha de Rickettsiosis se debe iniciar el tratamiento con antibiótico (doxiciclina v.o en pacientes con infección leve o i.v si es grave).	Reconocimiento temprano del cuadro clínico, brindar tratamiento específico después de haber analizado de qué M.O se trata. Seguir el tratamiento por lo menos 7 días.	En caso de haber presentado ulceraciones en la piel podemos emplear otras medidas. En pacientes con lesión cardíaca o EVC se pueden emplear tratamientos de acorde a su patología.			