



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Cuadro comparativo

Nombre del alumno: Diana Monserrat Espinosa Espinosa

Nombre de la asignatura: enfermedades infecciosas

Semestre y grupo: 6°B

Nombre del profesor: Dr.Cancino

Comitán de Domínguez, Chiapas 22 de junio del 2020

	Dengue	Chinkunnguya	Zika
Etiología	DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4 Aedes aegypti	Aedes aegypti familia Togaviridae	Aedes causada por el virus Zika (ZIKV)
Manifestaciones clínicas	<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre elevada (40 °C) • Dolor de cabeza muy intenso • Dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares • Náuseas • Vómitos • Agrandamiento de ganglios linfáticos • Salpullido. 	<ul style="list-style-type: none"> • La sintomatología es aparente entre 1 a 12 días posteriores con un promedio de 3-7 días. • Aparece con fiebre repentina 39°C Poliartalgias severas y que postran a las personas. • Puede acompañarse de cefalea mialgias • Conjuntivitis con enrojecimiento importante • Vómito • Náuseas, • Linfadenopatías • Rash 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre leve • Sarpullido (principalmente maculo-papular) • Dolor de cabeza • Dolor en las articulaciones, dolor muscular • Malestar general • Conjuntivitis no purulenta que ocurre entre 2 a 7 días después de la picadura del mosquito vector.
Con síntomas de alarma	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor espontáneo o provocado de abdomen • Vómitos persistentes • Acumulación clínica de fluidos (ascitis, derrame pleural p. ej.) • Sangrado de mucosas • Letargia:irritabilidad • Hepatomegalia >2 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Uveítis (importante diferenciarlo con leptospirosis) • Mielitis • Retinitis • Hepatitis • Nefritis • Miocarditis • Manifestaciones del sistema nervioso • Corno parálisis de los nervios craneales • Síndrome de GuillainBarre • Meningoencefalitis 	
Relevancia en cada una de las patologías	Los síntomas se presentan al cabo de un periodo de incubación de 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito infectado y por lo común duran entre 2 y 7 días.	Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura de mosquitos, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12	usualmente leve, con síntomas que pueden durar entre 2 y 7 días

Tratamiento	Primoinfección el tratamiento es sintomático, utilizando paracetamol como medicamento de elección la enfermedad cede en forma espontánea entre 2 a 12 días CON SIGNOS DE ALARMA Promover líquidos orales ante la intolerancia oral iniciar líquidos IV con solución salina 09% o lactato de Rínger & tasa de mantenimiento CON DATOS DE ALARMA Comenzar con líquidos IV con soluciones Isotónicas cristaloides a 510 ml/kg/hr durante una hora.	Manejo sintomático	El tratamiento consiste en aliviar el dolor y la fiebre o cualquier otro síntoma que cause molestias al paciente. Para evitar la deshidratación producto de la fiebre, se recomienda controlarla, guardar reposo y tomar abundante agua. No hay una vacuna o medicamento específico contra este virus
--------------------	---	--------------------	---