



Universidad del Sureste

Medicina Humana

HNE de Fiebre Manchada

Ana Ingrid Gordillo Mollinedo

Nombre de la asignatura: Enfermedades Infecciosas

Semestre y grupo: 6°B

Docente: Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 13 de junio de 2020.

HNE DE FIEBRE MANCHADA

Periodo Prepatogénico		Periodo Patogénico		
<p>Agente: bacteria <i>Rickettsia rickettsii</i>, transmitida por la garrapata</p> <p>Huésped: Humano, cualquier edad</p> <p>Medio ambiente Más frecuente en zonas boscosas, casas con zoonosis.</p>				
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #c8e6c9; display: inline-block;">Puerta de entrada</div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #c8e6c9; display: inline-block;">Por medio de picadura de la garrapata</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #c8e6c9; display: inline-block;">Por medio de la picadura de la garrapata se transmite esta bacteria por vía hematógica provocan vasculitis secundaria, afectando a células endoteliales de capilares, arteriola, venas, conduciendo al depósito de fibrina y plaquetas que dan origen a la eclosión de vasos sanguíneos.</div>		
Prevención Primaria		Prevención Secundaria		Prevención Terciaria
Promoción a la salud	Protección específica	Diagnóstico precoz	Tratamiento Oportuno	Rehabilitación
<p>Informar a las personas por diferentes medios de comunicación sobre la enfermedad.</p> <p>Realizar campañas de salud y dar pláticas sobre la transmisión de la enfermedad y medidas de higiene.</p>	<p>Mantener higiene adecuada en las casas, evitar zonas con humedad.</p> <p>Evitar tener perros dentro de las casas.</p> <p>Uso de repelentes contra garrapatas.</p>	<p>Clínica.</p> <p>Exploración física.</p> <p>Serología: Pruebas de aglutinación: Las aglutininas de Proteus aparecen en la segunda semana de la enfermedad y alcanzan el título más elevado en la tercera semana.</p>	<p>Administración de antibióticos por vía oral, además de un tratamiento sintomático de sostén. Las tetraciclinas son el tratamiento de elección. El cloranfenicol es igualmente eficaz pero se reservará para los casos en que estén contraindicadas las primeras.</p>	<p>Vigilar la evolución de la enfermedad.</p> <p>Prevención para evitar picaduras de garrapatas.</p> <p>Ante lesiones cutáneas optar por otras medidas.</p>
Primer nivel	Segundo nivel	Tercer nivel		Cuarto nivel

