



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

“diagnóstico diferencial de dengue, zika, chikungunya”

Presenta la alumna:

María de Jesús Peñaloza Landa

6to semestre grupo B

Docente: Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Materia: enfermedades infecciosas

Comitán de Domínguez, Chiapas, 22 de junio de 2020

Diagnóstico diferencial



Dengue

- ✓ Con la picadura los síntomas aparecen de 3 a 7 días después
- ✓ Fiebre alta (40°C)
- ✓ Cefalea intensa
- ✓ Sensación de cansancio
- ✓ Malestar general
- ✓ Vómitos
- ✓ Dolores musculares (mialgias)
- ✓ Dolores articulares (artralgias)
- ✓ Parches de sangre bajo la dermis (en el dengue con datos de alarma)
- ✓ Disminución del apetito
- ✓ Dolor alrededor de los ojos y retro globular
- ✓ Sudoración
- ✓ Síntomas duran de hasta 7 días

- Tratamiento: analgésicos paracetamol e hidratación oral.
- En casos de alarma administración de líquidos vía venosa y transfusiones plaquetarias



Chikungunya

- ✓ Con la picadura los síntomas aparecen de 3 a 7 días después
- ✓ Fiebre alta (40°C)
- ✓ Cefalea
- ✓ Sensación de cansancio
- ✓ Malestar general
- ✓ Náuseas
- ✓ Dolores musculares (mialgias)
- ✓ Fuertes dolores articulares (artralgias)
- ✓ Manchas rojas o puntos en la piel que se acompañan de picor
- ✓ Inflamación de las articulaciones
- ✓ Artritis
- ✓ Síntomas duran de 4 a 7 días

- Tratamiento: sintomático

Zika

- ✓ Con la picadura los síntomas aparecen de 3 a 7 días después
- ✓ Fiebre alta (40°C)
- ✓ Cefalea
- ✓ Diarrea
- ✓ Malestar general
- ✓ Vómito
- ✓ Dolores musculares (mialgias)
- ✓ Conjuntivitis no purulenta
- ✓ Artritis o artralgias
- ✓ Erupciones en la dermis con puntos rojos y blancos
- ✓ Falta de apetito
- ✓ Dolor retro globular
- ✓ Dolor abdominal
- ✓ Síntomas duran de 4 a 7 días

- Reposo
- Hidratación
- Analgésicos para control de dolor.