



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Historia clínica

Nombre del alumno: Diana Monserrat Espinosa Espinosa

Nombre de la asignatura: enfermedades infecciosas

Semestre y grupo: 6°B

Nombre del profesor: Dr.Cancino




Comitán de Domínguez, Chiapas 08 de mayo del 2020

BRUCELOSIS

PERIODO PREPATOGENICO

Agentes: bacteria cocobacilar gram negativa(2,4,7), de 0.5 a 0.7 μm de diámetro por 0.6-1.5 μm de largo, intracelular, facultativa, no esporulada, acapsulada, sin pilis o flagelos, poseen una envoltura celular



Huésped: animales y humanos

Ambiente: suelo contaminados, estiércol de animales enfermos, leche contaminada

PERIODO PATOGENICO

Muerte

Complicaciones de endocarditis y encefalitis

Secuelas

Lesiones óseas y articulares, encefalitis, endocarditis infecciosa e incluso meningitis.

Complicaciones:

Artritis, encefalitis/Meningitis, orquiepididimitis, uretritis, neumonía, conjuntivitis, hepatitis, endocarditis, esplenomegalia

Signos y síntomas inespecíficos:

Fiebre, escalofríos, pérdida de apetito, sudores, debilidad. fatiga, dolor articular, muscular y de espalda, dolor de cabeza.

Signos y síntomas inespecíficos:

Fiebre undulante, adenopatías, hepatoesplenomegalia, complicaciones oostroarticulares

Luego de ser introducidas en el organismo las bacterias pasan con rapidez de la linfa a los ganglios linfáticos regionales y a la sangre donde rápidamente son fagocitadas por los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos (PMN) que poseen la capacidad de destruir a las brucelas fagocitadas pero no en su totalidad

La puerta de entrada: por vía oral, parenteral, nasal o inhalatoria

Promoción a la salud	Educación para la salud	Protección específica	Diagnostico precoz	Tratamiento oportuno	Limitación de daño	Rehabilitación
Tener una higiene adecuada.	Dar platicas a la gente para que conozca los principales síntomas y que acudan a su unidad de salud más cercana	Buena higiene e n los animales de granjas. Lavado de manos	Hacer un examen físico del paeinte y si esta en una zona endémica actuar porque los síntomas son confusos . Hacer examen sanguíneo, en heces y orina.	Rifampicina Paracetamol, ranitidina, antimimeticos centrales, metoclopramida	Se deben tomar las medidas necesarias para evitar que aparezcan complicaciones	Quirurgico de las complicacioens Artritis encefalitis/Meningitis orquiepididimitis endocarditis Psicológica Fatiga, depresión y neurosis