

Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

Trastorno delirante

Criterios diagnósticos

- presencia de uno o mas delirios de un mes o mas de duración
- Nunca se ha cumplido a criterio A de las alucinaciones si existen, no son importantes y están relacionadas con el tema delirante (Como la sensación de estar infestado por insectos asociada a delirios de manifestación)
- Si se ha producido episodios maniacos O depresivos mayores y han sido breves en comparación con la duración de los periodos delirantes
- El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia O a otra afección médica Y no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno esquizoafectivo o el trastorno obsesivo compulsivo

Trastorno psicótico breve

- A presencia de uno o más de los síntomas siguientes. Al menos uno de ellos de ser 1,2, o 3 (**se repite 1 vez en trastorno esquizoafectivo, en esquizofrenia, en trastorno esquizoafectivo**)
- delirios (**todos los trastornos**)
- Alucinaciones (**todos los trastornos**)
- Discursos o desorganizados
- Comportamiento muy desorganizado o catatónico
- B la duración de un episodio del trastorno es al menos de un día pero menos de un mes, con un retorno final total al grado de funcionamiento previo a la enfermedad

- El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo mayor o bipolar con características psicóticas hubo otro trastorno psicótico como esquizofrenia o catatonía y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia

Trastorno esquizofreniforme

Esquizofrenia

- Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento en uno más ámbitos principales, como el trabajo las relaciones interpersonales O el cuidado personal, está muy debajo del nivel alcanzado antes del inicio(cuando comienza en la infancia o adolescencia fracasa la consecución del nivel esperado del funcionamiento interpersonal académico laboral)
- Los signos continuos del trastorno persisten durante mínimo seis meses este período ha de incluir al menos un mes de síntomas del criterio a

Transtorno esquizoafectivo

- Delirios o alucinaciones durante dos o más semanas con en ausencia de un episodio mayor del estado de ánimo (maníaco depresivo) durante todo el curso de la enfermedad
- Los síntomas que cumplen los criterios de un episodio mayor del estado de ánimo están presente durante la mayor parte de la duración total de las fases a activa residual de la enfermedad
- El transtorno no se puede atribuir a los efectos de una sustancia o a otra afección médica (**se repite en Trastorno psicótico debido a otra afección médica**)

Trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos

- Presencia de delirios o alucinaciones
- Pruebas de la historia clínica

- El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium
- El trastorno causa malestar clínico en ámbito social, laboral y otros campos

Trastorno psicótico debido a otra afección médica

No se explica mejor por otro trastorno mental

El transcurso no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium

Malestar clínico en los ámbitos