

## Albores Ocampo Dayan Graciela Cuarto semestre, grupo B

**Cauterización eléctrica:** Destrucción de tejido un con tipo especial de corriente eléctrica.

**Ejercicios Kegel:** Ejercicios especiales para fortalecer los músculos pélvicos. Estos ejercicios se usan para tratar el prolapso uterino y la incontinencia urinaria (la eliminación de orina cuando no se desea).

**Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI):** Infección causada por bacterias, generalmente de una enfermedad de transmisión sexual (vea "Enfermedad de transmisión sexual"). La EPI puede afectar al útero, los ovarios y las trompas de Falopio. Puede causar dolor pélvico persistente y, si no se trata, puede causar infertilidad (incapacidad de quedar embarazada). A veces, la infección que causa EPI se transmite a través del uso de un dispositivo intrauterino o durante el parto o aborto.

**Espéculo:** Instrumento de metal o plástico que el médico inserta en la vagina para ayudar a examinar la vagina y el cuello uterino.

**Examen de Papanicolaou (prueba "Pap"):** Procedimiento que no causa dolor en el que se extraen células del cuello uterino durante un examen vaginal, se colocan en un portaobjetos y se examinan mediante un microscopio para determinar si hay signos de cáncer o de estados precancerosos.

**Histerectomía:** Operación para extraer el útero. A veces, el cuello uterino o los ovarios, y las trompas de Falopio también se extraen.

**Laparoscopia:** Operación que permite al médico observar el interior de la cavidad pélvica al insertar un instrumento en forma de tubo a través de una pequeña incisión en el abdomen.

**Miomectomía:** Operación para extraer tumores fibroides.

**Ooforectomía:** Extracción de un ovario.

**Fibromas:** Masas no cancerosas que ocurren más frecuentemente en las paredes del útero.