



Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Antropología Medica II

Trabajo:

Control de lectura.

Docente:

Dr. Sergio Jiménez Ruiz.

Alumno:

Casto Henri Mendez Mendez

Semestre y grupo:

2° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 09 de junio de 2020.

05/junio/2020.

Obstinación Terapéutica

El llamado "Encamizamiento terapéutico", es una expresión coloquial popularizada por los medios de comunicación social.

Implica una intencionalidad o por lo menos conciencia de que se trata de algo inhumano, que no se corresponde en la mayoría de casos con intenciones del médico.

Por eso se le da esa expresión más adecuada es la obstinación terapéutica.

Factores causales.

Los factores causales de la conducta distanciosa y obstinación terapéutica son:

- Convencimiento acritico de algunos médicos de la vida biológica es un bien, por el que se debe luchar.
- Adopción de medidas terapéuticas que contemplan más los aspectos científicos de la enfermedad que al enfermo, afectado de un proceso irreversible.
- Ignorancia o desprecio del derecho del paciente, o de sus representantes legales o familiares en su nombre o rechazar al inicio o continuación de tratamientos médicos que prolonguen el sufrimiento del enfermo crítico o la agonía del paciente terminal.
- Angustia del médico ante el fracaso terapéutico y resistencia a aceptar su muerte del paciente. La dificultad del pronóstico, la experiencia del médico las circunstancias del paciente.

Factores propensos de aptitudes y conductas distanciar, la exigencia de los familiares de que se haga todo lo humanamente posible, o incluso imposible para salvar la vida del paciente; la falta de comunicación entre el equipo asistencial y familia, en relación con los deseos del paciente.

Algunos pacientes que ingresan en UCI, consideramos que también tienen alto riesgo de recibir tratamientos inútiles o desproporcionados, los siguientes:

- Niños muy prematuros, de muy bajo peso al nacer y poca semana de gestación.
- Pacientes crónicos con historias clínicas graves y remisiones.
- Pacientes terminales, pacientes tetraplégicos.
- Pacientes con deterioro psíquico afecto de patología tipo Alzheimer.

Algunos de estos pacientes corren el riesgo de que la evolución no sea la esperada por los médicos, quienes finalmente pueden caer en obstinación terapéutica con la mejor de las intenciones empleando medios desproporcionados o inútiles que no deberían utilizarse.

- Consecuencia
- Causar dolor y sufrimiento innecesario a pacientes y familiares.
 - Proflexión de los pacientes y cuidadores.
 - Creación de un clima favorable a la despenalización de la eutanasia activa al valorar que es la mejor muerte...

◦ Disminución de la confianza en los médicos y en la asistencia hospitalaria.

Prevención

- Respetar los derechos de los pacientes o de sus representantes de aceptar o rechazar un tratamiento.
- Información y comunicación correcta al paciente y cuando ello sea posible a quien pueda representar.
- Velar por la mejora de la docencia en las facultades de medicina sobre el correcto tratamiento del dolor, insistiendo en el deber y responsabilidad de controlarlo correctamente.

Práctica médica científicamente correcta y correcta decisión ética. (Principios).

- El beneficio del paciente tiene prioridad en relación a cualquier otro objetivo.
 - El médico debe cumplir siempre los exigencias éticas y legales del consentimiento informado.
- Actitudes y conductas.
- Debe respetarse el derecho de todo paciente competente, a rechazar un tratamiento si lo hace libremente.

◦ Nadie está obligado a someterse a tratamientos desproporcionados para preservar la vida.

◦ Estado vegetativo persistente o permanente (EVP).

◦ Toda la importancia de estos cuadros clínicos y la transparencia de las decisiones a tomar ante estos casos.

CONAPE

Consejo Nacional de Política Educativa

Referencia.

- OBSTINACIÓN TERAPÉUTICA. Documento de la Real Academia de Medicina de Cataluña, aprobado por unanimidad en sesión plenaria de 28 de Junio de 2005.

Recuperado de <https://www.samfyc.es/pdf/GdTBio/201027.pdf>