

# Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

**Materia:**

**Antropología medica II**

**Trabajo:**

**Resumen.**

**Docente:**

**Dr. Sergio Jiménez Ruiz**

**Alumno:**

**Ulises Osorio Contreras**

**Semestre y grupo:**

**2° "A"**

**Comitán de Domínguez, Chiapas a; 15 de junio 2020.**



02-06-2020

## Obstinación terapéutica

### Definición

El llamado "encarnizamiento terapéutico" es una expresión coloquial - popularizada por los medios de comunicación social, en las lenguas románticas - que traduce de manera parcial aunque expresiva, el término más académico de "distanasia", palabra de origen griego que significa "muerte difícil o angustiosa". En el vocabulario de la ética se utiliza la palabra distanasia para indicar la utilización en el proceso de morir de tratamiento que no tienen más sentido que la prolongación de la vida biológica del paciente.

### Factores Causales.

Basicamente, los factores causales de la conducta distanásica u Obstinación terapéutica son:

1. Convencimiento acrítico de algunos médicos de que la vida biológica es un bien por el que se debe luchar, al margen de consideraciones sobre la calidad de esa vida y que a tal fin, deben utilizarse todas las posibilidades que la

2. A adaptación de medidas terapéuticas.  
3. Ignorancia o desprecio del derecho del paciente.  
4. Angustia de médico ante el fracaso terapéutico y resistencia a aceptar la muerte del paciente.

Factores predisponentes son factores predisponentes de actitudes y conductas distanásicas, la exigencia de los familiares de que se haga todo lo humanamente posible, o incluso imposible, para salvar la vida del paciente. La falta de comunicación entre el equipo asistencial y la familia, en relación con los deseos del paciente expresados; la falta de comunicación entre el equipo asistencial y la familia, en relación con los deseos del paciente expresados antes de encontrarse en estado inconsciente, la suerte del paciente y circunstancias que hacen particularmente difícil el pronóstico respecto a la posibilidades de supervivencia y la calidad de vida.

## Consecuencias

Las consecuencias de las conductas distanásicas son: 1) Causar dolor y sufrimiento innecesario a paciente y familiares; 2) Reflexión de los ciudadanos y pacientes sobre la necesidad de contar con apoyo legal para protegerse de los que se considera un poder incontrolado de los médicos en el tratamiento de los enfermos; 3) Creación de un clima favorable a la despenalización de la eutanasia activa al valorar que es mejor la muerte que el sufrimiento inútil; 4) Disminución de la confianza en los médicos y en la asistencia hospitalaria.

## Prevención

Consideramos las siguientes medidas como las más eficaces para prevenir las conductas distanásicas.

- Respetar el derecho de los pacientes o de sus representantes de aceptar o rechazar un tratamiento.

- Información y comunicación correctas al paciente y cuando e/lo no sea posible a quien pueda representar mejor sus intereses.

Referencia bibliográfica:

Documento de la Real Academia de Medicina de Cataluña, aprobado por unanimidad en sesión plenaria de 28 de Junio de 2005.

Redactores-ponentes: Dr. Jordi Sans Sabrafen (q.e.p.d.) y Dr. Francesc Abel Fabre, s.j.