

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Materia:

MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA

Investigación

Q.c. Gladys Elena Gordillo Aguilar

Alumna. Heydi Antonia Coutiño Zea

2-“B”

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 19/06/2020.

LINFOMA DE BURKITT

¿QUE ES? Tipo de linfoma no Hodgkin de células B agresivo (de crecimiento rápido) que se presenta con mayor frecuencia en los niños y los adultos jóvenes. Es posible que la enfermedad afecte la mandíbula, el sistema nervioso central, el intestino, los riñones, los ovarios u otros órganos. Hay tres tipos principales de linfoma de Burkitt: esporádico, endémico y relacionado con la inmunodeficiencia. El linfoma de Burkitt esporádico se presenta en todo el mundo, el linfoma de Burkitt endémico se presenta en el África y el linfoma de Burkitt relacionado con la inmunodeficiencia se observa con mayor frecuencia en los pacientes de SIDA.

QUE TAN FRECUENTE SON EN MEXICO

EUA 7 de cada 100,000

Mexico 5.4% de todas neoplasias

Incidencia igual en H y M

Pico de aparición preadolescencia e incrementan exponencialmente

Aumente en personas con VIH

SINTOMAS El LB se puede notar inicialmente como una inflamación de los ganglios linfáticos (glándulas) en la cabeza y cuello. Estos ganglios linfáticos inflamados frecuentemente son indoloros, pero pueden crecer muy rápidamente. En los tipos comunmente vistos en los Estados Unidos, el cáncer a menudo comienza en el área del vientre (abdomen). La enfermedad también puede iniciar en los ovarios, los testículos, el cerebro, los riñones, el hígado y el líquido cefalorraquídeo.

Otros síntomas generales pueden incluir:

Fiebre

Sudoración nocturna

Pérdida de peso inexplicable

LEUCOPLAQUIA VELLOSA ORAL

¿QUE ES? Enfermedad de las membranas mucosas que ocurre sobre todo en las personas con el VIH. Se caracteriza por lesiones blancas o grises que ocurren normalmente en la lengua o dentro de la mejilla. Esas lesiones tienen una apariencia acanalada y pilosa.

QUE TAN FRECUENTE SON EN MEXICO Una prevalencia media de leucoplasia oral en el mundo que oscila entre 1% y el 5% de la población, aunque estas cifras se elevan considerablemente en los países del sureste asiático

SINTOMAS

En la mayoría de los casos, blancos o grises.

Desiguales en contorno.

Cubiertos de pelusa (**leucoplasia vellosa oral**)

Ligeramente elevados, con una superficie dura.

Imposibles de raspar.

Dolorosos cuando los parches en la boca entran en contacto con alimentos ácidos o condimentados.

LINFOMA DE LINFOCITOS B MALIGNOS

¿QUE ES? El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras áreas. Si desea más información sobre el origen y la propagación de los cánceres

El linfoma no Hodgkin (también conocido simplemente como linfoma o NHL, por sus siglas en inglés) es un cáncer que comienza en los glóbulos blancos llamados linfocitos que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo.

QUE TAN FRECUENTES SON EN MEXICO Su incidencia representa cerca del 4% de los cánceres de edad pediátrica de 4.5 por cada 100.000 habitantes.

SITOMAS

Fiebre

Fatiga persistente

Sudoración nocturna

Hinchazón o dolor abdominal

Hinchazón sin dolor de los ganglios linfáticos del cuello, de las axilas o de la ingle

CANCER NASOFARINGEO

¿QUE ES? El cáncer nasofaríngeo es un tipo de cáncer de cabeza y cuello que comienza en la nasofaringe, la parte superior de la garganta que se encuentra detrás de la nariz y cerca de la base del cráneo. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control.

QUE TAN FRECUENTE SON EN MEXICO En México, el carcinoma nasofaríngeo no figura entre las 20 principales causas de cáncer. Esta neoplasia se ha relacionado con el virus Epstein-Barr, pero en su aparición también intervienen factores genéticos, raciales, ambientales y dietéticos. Los síntomas iniciales son inespecíficos, por lo que el paciente y el médico de primer contacto los pasan por alto. La manifestación sintomática más común es la linfadenopatía cervical, que puede ser bilateral y voluminosa incluso en 50% de los afectados. Se comunica el caso de un paciente de 70 años de edad con diagnóstico de carcinoma nasofaríngeo, que acudió al servicio de medicina interna por adenopatía cervical bilateral, y cuyo diagnóstico final requirió un enfoque multidisciplinario

SINTOMAS

Un bulto en el cuello causado por un ganglio linfático inflamado.

Presencia de sangre en la saliva.

Supuración de sangre de la nariz.

Congestión nasal o zumbido en los oídos.

Pérdida de la audición.

Infecciones frecuentes del oído.