



UNIVERSIDAD
DEL SURESTE

"Pasión^{por}
educar"

NOMBRE DEL ALUMNO: CARLOS ANDRES AGUILARAGUILAR

GRADO:6 TO GRUPO: A

NOMBRE DE LA PROFESORA: BEATRIZ GORDILLO LOPEZ

SUBMODULO II

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2020

TROMBOSIS

Muchos factores pueden aumentar el riesgo de sufrir trombosis venosa profunda. Cuantos más tengas, el riesgo de que la padezcas será mayor.

Heredar un trastorno de coagulación de la sangre.

El reposo prolongado, como una estancia hospitalaria larga, o parálisis

Lesiones o cirugía

Insuficiencia cardíaca.

FACTORES DE RIESGO

Se produce cuando se forma un coágulo de sangre (trombo) en una o más venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas.

Hinchazón en la pierna afectada. Rara vez se hinchan ambas piernas

Enrojecimiento o manchas en la piel de la pierna.

SIGNOS Y SINTOMAS

Sensación de calor en la pierna afectada

CAUSAS

Los coágulos de sangre de la trombosis venosa profunda se pueden producir como consecuencia de cualquier cosa que impida que la sangre circule o se coagule normalmente

Lesión en una vena, una cirugía, ciertos medicamentos y la limitación del movimiento.

CUIDADOS DE ENFERMERIA

REPOSO EN CAMA

Vigilar pulsos periféricos

Medir el diámetro del miembro afectado a diario.

BIBLIOGRAFIA. DOCUMENTO PROPORCIONADO POR EL DOCENTE