



Docente: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA

Alumna: Paola Pinto Pérez

Materia: Fundamento de enfermería

Grupo: "A"

Carrera: Enfermería

Pichucalco, chis. Julio, 2020

Administración de medicamento vía subcutánea

Definición

Es la introducción de una sustancia a través de la piel hasta el tejido subcutáneo.

Objetivo

Aplicar una sustancia que no irrita los tejidos y con la cual se busca en la mayoría los casos una absorción lenta.

Precauciones

- * No hacer masaje después de aplicar el medicamento.
- * Explicar el procedimiento al paciente y la familia.
- * Emplee la aguja con la jeringa adecuada (Jeringa de insulina).

Procedimiento

- * Tenga en cuenta el procedimiento general para administración de medicamento por vía parental.
- * Descubra y desinfecte el área elegida.
- * Introduzca la aguja con ángulo de 90 grados si se usan las jeringas, anteriormente mencionadas, de lo contrario colóquela en ángulo de 45° inyecte el líquido y saque la aguja sin hacer masaje.
- * Registre el procedimiento en la historia clínica.

Administración de medicamentos vía intravenosa

Administración

- * Se refiere al conjunto de actividades encaminadas a suministrar intravenosas sin diluir o pocas diluidas sanguíneas.
- * Asegúrese de que el paciente no es alérgico al fármaco a administrar.
- * Coloque el compresor
- * Elija una vena de grueso calibre.
- * Inmovilice la vena, sujetándola con el dedo pulgar y traccionando la piel.
- * Insertar la aguja con un ángulo de 30 grados.
- * aspire lentamente y compruebe si refluye sangre.
- * Retire el compresor e inyecte el fármaco lentamente
- * Extraiga la aguja y aplique presión con una gasa estéril hasta que deje de sangrar el punto de punción.

Administración de medicamento vía intradérmica

Definición

Es la solución en la capa superficial de la piel, cuya característica es la formación de un botón palido en forma de la piel naranja.

Objetivo

La introducción de sustancia para ayudar al diagnóstico, pruebas de sensibilidad y como medida preventiva.

Precauciones

- * Explique el procedimiento al paciente y la familia.
- * Utilizar agujas de calibre delgado. No 25 y 26.
- * Aplicar la dosis exacta.
- * Utilizar jeringa adecuada.
- * Verificar la formación del botón palido (Piel de naranja).
- * No hacer masajes.
- * Explicar al paciente la reacción que puede presentarse.
- * Vigilar la reacción del paciente en prueba de sensibilidad y notificar al médico.

Procedimiento

- * Descubra la zona de aplicación.
- * Haga la desinfección del área con técnica aséptica.
- * Tome la jeringa con el bisel hacia arriba e introduzca la en un ángulo de 10-15 grados de tal forma que la punta de la aguja quede en la dermis.
- * Inyecte la sustancia lentamente hasta formar el botón. Retire la aguja sin hacer masaje.
- * Registre el procedimiento en la historia clínica.

Administración de medicamentos vía intramuscular

Definición

Es la introducción de una sustancia a través de la piel hasta el tejido muscular.

Objetivo

- * Aplicar sustancias que por su composición química afectan el tejido celular subcutáneo.
- * Lograr una absorción más rápida.
- * Aplicar mayor volumen de una sustancia que por vía subcutánea sería más dolorosa.

Procedimientos

- * Explique el procedimiento al paciente y la familia.
- * Descubra y desinfecte el área elegida teniendo en cuenta la técnica aséptica.
- * Deje secar el desinfectante.
- * Saque el aire de la jeringa, teniendo la aguja hacia arriba.
- * Se toma con una mano la masa muscular del sitio en que se aplicará la inyección para estabilizar el miembro, se comprime dicha masa para inyectar con la mano.
- * Introduzca la aguja en posición perpendicular a la piel.
- * aspire para cerciorarse que no ha penetrado ningún vaso.
- * Introduzca el medicamento lentamente.
- * Haga presión en el sitio de aplicación.
- * Registre el procedimiento en la historia clínica.

Administración de medicamento vía oral

Definición

Es el procedimiento mediante el cual se suministra por vía bucal medicamento que tengan acción local o general como tabletas, capsula, suspensiones, jarabe etc.

Recomendaciones

- * Evitar la administración de medicamentos por esta vía a pacientes inconsistentes con náuseas, emesis y trastornos bucales, faríngeos y esofágicos.
- * Ofreer agua al paciente para disolver los medicamentos.
- * Administrar el medicamento al paciente en posición sentada.
- * No dar medicamentos orales a pacientes en recuperación de anestesia, ya que en ese momento el reflejo de deglución está disminuido.

Procedimiento

- * Utilizar siempre para droga oral recipientes limpios y secos.
- * Consultar la historia clínica y la tarjeta de drogas.
- * Buscar en el botiquín el medicamento indicado.
- * Medir el medicamento exacto utilizando elementos de medición indicados como: jeringas, cucharas med.
- * Llevar la bandeja al lado del paciente.
- * Pasar al paciente el medicamento.
- * Colocar al paciente en posición semi-Fowler o sentada.
- * Observar cualquier reacción que presente el medicamento y de aviso al médico inmediatamente.
- * Dejar el equipo limpio y en orden.