Universidad del sureste

Pasión por educar

Asignatura

Morfología y función

Catedrático

Dr. Fernando romero peralta

Carrera

Lic. Enfermería

Tema

Derivados mesodérmicos

Alumna

Clarita del Carmen López Trejo

3er cuatrimestre

Pichucalco, Chiapas 28 de julio del 2020

Dederivados mesodérmicos

Capa interna intermedia de las 3 forma el embrión en desarrollo. De ella se deriva los huesos, el tejido conectivo y los músculos.

¿Que forma la mesodérmica?

Forma capas delgadas laminadas de tejidos laxos a cada lado de la línea media

Los tejidos se dividen en dos

1.- Mesodermo

2. mesodérmica

Derivadas de la mesodérmicas

1.- una capa somática o parietal

2.- una capa asplácnica o visceral

Son capas continua co9n los mesodérmicos y mesodermo que son recubredoras

Mesodermo paraxial

Es la formación de los sentidos céfalo caudal que consiste a la célula mesodérmicas dispuesta en remolina concéntrica alrededor de la unidad

Mesodermo interno

Es parte de los mesodérmicos es decir es el que conecta temporalmente el mesodermo paraxial con la placa lateral.

Principales Mesodérmicos

1.- músculos

2.- huesos

3.- vasos sanguíneos

Son principales del mesodermo ya que es durante las etapas del desarrollo embrionario de olas células y tejidos

Mesodérmicos capa intermedia

1.- músculos cardiacos, músculos esqueléticos células tubulares

2.- glóbulos rojos y musculo liso

Son partes de los mesodérmicos ya que eso ayuda a forma la capa intermedio de los mesodérmicos y mesodermo