

Nombre de alumna: Sara Galilea Martínez Quevedo.


Nombre del docente: Dr. Fernando Romero Peralta

Nombre del trabajo: mapa conceptual sobre las alteraciones osteoarticulares que requieren cirugía

Materia: Enfermería medico quirúrgica II

Grado: 6to cuatrimestre

Pichucalco; Chiapas a 6 de julio del 2020



Síntomas y tratamiento

lesiones osteoarticulares

las lesiones osteoarticulares son enfermedades degenerativas que comprometen al sistema locomotor

El síndrome del túnel tarsal se da debido a que el nervio tibial posterior es comprimido en el túnel tarsal

síndrome tunel carpal.es la inflamacion como ligamentos y tendones en las manos

osteoartritis es una enfermedad inflamatorio natural que se da cuando el cartilago articular se empieza a desgastar

La espondilitis anquilosante es un proceso inflamatorio crónico de carácter reumatológico que afecta principalmente las articulaciones de la columna vertebral

bursitis es la inflamación de la bolsa o saco lleno de líquido que sirve para reducir la fricción entre los huesos de la articulación.

dormecimiento en la planta del pie.Dolor,Sensación de quemazón y Hormigueo en la base del pie y el talón.

se hace una cirugía de liberación del túnel será necesaria, alrededor de 30 o 45 minutos.

Dolor en la muñeca, así como en el antebrazo o palma de la mano.Síntomas que agravan en la noche y Parestesias nocturna

Tratamiento farmacológico con antiinflamatorios o analgésicos tales como: ibuprofeno, ketoprofeno o aspirina. En otros casos, cortisona y cirugía si el tratamiento conservador no dio resultado

Dolor crónico,Rigidez,Sensibilidad en la zona afectada,protuberancias óseas en las manos causan los conocidos nódulos de Heberden

Se refiere al procedimiento quirúrgico que se realiza para:Remover fragmentos perdidos de hueso o cartilago de la articulación si son la causa de los síntomas mecánicos (torcerse o trabarse) Revestimiento óseo,Reposición ósea y Reemplazo Óseo o Artroplastia (reemplazo articular)

El dolor y la rigidez son peores en la noche, en la mañana o cuando no se está activo,dolor mejora particularmente con ejercicio o actividad, dolor de espalda puede comenzar en las articulaciones sacroilíacas (entre la pelvis y la columna) y Fatiga

La cirugía se considera cuando el dolor o el daño de las articulaciones es severo.

Dolor articular,disminución del movimiento,incapacidad funcional,hipersensibilidad en la zona,hinchazón y La articulación puede sentirse caliente

en procedimiento quirurgico se aplica un drenaje si es requerido.