



NOMBRE DEL ALUMNO (A):

JUANA LORENZA VELAZQUEZ HERNANDEZ.

NOMBRE DEL PROSESOR:

LIC. MAHONRRY DE JESUS RUIZ GUILLEN.

NOMBRE DEL TRABAJO:

MAPAS CONCEPTUALES.

MATERIA:

ENFERMERIA DEL ADULTO I.

LICENCIATURA:

ENFERMERIA.

GRADO:

6 CUATRIMESTRE.

GRUPO:

“A”

Pichucalco, Chiapas a 02 de agosto 2020.

## GASTROENTERITIS.

**¿Qué es?** esta se define como la infección o inflamación del revestimiento interno (mucosa) del estómago y el intestino delgado.

La gastroenteritis representa la segunda mayor causa de muerte en niños mayores de cinco años.

### Causas:

Esta se puede producir por tres tipos de microorganismos que son: virus, bacterias y parásitos, estos organismos presentes en las heces de un infectado puede contaminar alimentos y bebidas así como otros objetos.

### Los virus más comunes son:

Rotavirus, norovirus, adenovirus entérico y astrovirus

**Rotavirus:** es la principal causa de gastroenteritis aguda en niños.

**Norovirus:** esta afecta a personas de todas las edades pero su contagio es mas frecuente en niños escolares.

**Adenovirus entérico:** se presenta en niños pequeños.

**Astrovirus:** se conoce como otro agente de gastroenteritis infantil.

### Síntomas:

- Dolor abdominal
- Vómitos
- Nauseas
- Diarrea

### Factores de riesgo:

- Edad avanzada
- Bebes y niños.
- Enfermos inmunodeprimidos.

### Prevención:

Existen vacunas para los virus.

### Diagnostico:

Esta enfermedad produce deshidratación, lo cual presenta: sequedad bucal, orina de color amarillo intenso y confusión.

### Tratamiento:

- reposo alimenticio.
- sueros orales.
- antibióticos.

## ETS.

Son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual

La mayoría de ETS afectan tanto a hombres como a mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que provocan pueden ser más graves en las mujeres. Un ejemplo sería si una mujer está embarazada puede causarle graves daños a su bebé.

**Gonorrea:** es una infección causada por una bacteria **Neisseria gonorrhoeae** de transmisión sexual, vaginal u oral, esta afecta con mayor frecuencia la uretra, el recto o la garganta. En las mujeres la gonorrea puede infectar al cuello de la matriz.

**Síntomas en hombres:** dolor al orinar, secreción de pus en el pene, dolor o hinchazón en un testículo.

**Mujeres:** aumento de flujo vaginal, dolor al orinar, sangrado vaginal y dolor pélvico.

### Factores de riesgo:

- Tener una nueva pareja sexual.
- Tener una pareja sexual que tenga otras parejas.
- Tener más de una pareja sexual.

**Complicaciones:** infertilidad en ambos, mayor riesgo de contraer VIH-SIDA y complicaciones en los bebés.

**Prevención:** usar preservativo, limitar el número de parejas sexuales.

**Tratamiento:** antibióticos.

**Sífilis:** es una infección causada por una bacteria llamada **Treponema pallidum** que se transmite por contacto sexual, la enfermedad comienza como una llaga indolora por lo general en los genitales, el recto o la boca.

**Síntomas:** llagas, crecimiento de verrugas en los genitales, flujo vaginal, dolor en la garganta, fatiga, ganglios inflamados y pérdida de peso.

**Tratamiento:** se trata con penicilina y antibióticos.

## ETS.

**Chancro:** esta es una infección producida por una bacteria llamada **Haemophilus ducrey**, se presenta por úlceras en los genitales, esta se diagnostica a través de una obtención de una muestra de la lesión.

**Tratamiento:** se trata con antibiótico por vía oral como: ciprofloxacino, azitromicina y ceftriaxona.

**VIH-SIDA:** El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una afección crónica provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

El VIH debilita el sistema inmunitario al punto de evolucionar el SIDA.

**Síntomas:** fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, erupción, dolor de garganta, ganglios inflamados, diarrea, pérdida de peso, tos y sudores nocturnos. .

**Como se transmite:** tener relaciones sexuales, por compartir agujas, por transfusiones sanguíneas, durante el embarazo, parto o lactancia.

El VIH no se transmite por abrazos, besos, bailar o saludar de mano.

**Factores de riesgo:** tener relaciones sexuales sin protección, usar drogas intravenosas,

**Complicaciones:** neumonía, candidiasis, tuberculosis, citomegalovirus, meningitis y toxoplasmosis.

**Tipos de cáncer frecuentes:** linfoma, sarcoma de Kaposi.

**Tratamiento:** no hay cura para esta enfermedad solo se puede llevar terapias.