Nombre del alumno(a):

Estrella Pinto Grajales

Nombre del profesor:

Lic. Nancy Domínguez torres

Nombre del trabajo:

Patología más frecuentes y prevalentes en adulto mayor

Materia:

Enfermería del adulto

Grado: 6° cuatrimestre

Grupo: “A”

Pichucalco, Chiapas a 8 de junio del 2020

Artritis y artrosis

La artritis es una inflamación en las articulaciones que suele provocar hinchazón articular.

La artrosis suele ser una consecuencia de un cuadro de artritis grave.

la artrosis aparece por la degeneración del cartílago articular a causa de la edad, provocando dolor en el movimiento y dificultades motoras.

Lleva un tratamiento basado en antiinflamatorios, infiltraciones y rehabilitación.

Hipertensión arterial: fuerza ejercida contras las paredes de las arterias, a medida que el corazón bombea sangre al cuerpo

Causas:

*cantidad de agua y sal en el cuerpo.
*Estado de los riñones, sistema nervioso y los vasos sanguíneos.
*niveles hormonales.

Factor de riesgo

- Obesidad
- Estrés o ansiedad
- Consumo excesivo de alcohol
- Antecedentes familiar
- Diabetes o fumar

Síntomas

- Dolor d cabeza
- Nauseas o vomito
- Cambios en la visión
- Sangrado nasal

tratamiento

- Alimentación saludable
- Tomar mucha agua
- Dejar el habito de fumar
- Reducir la cantidad de sal que consume
- Mantener un peso saludable
- Ejercicio físico

Diabetes: enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre.

Personas con diabetes presenta hiperglucemia debido a:

El páncreas no produce suficiente insulina
Células no responden de manera normal a la insulina.

Síntomas

- Sed
- Deseo frecuentes de orinar
- Fatiga, visión borrosa
- Hambre excesiva
- Pérdida de peso
- Dolor de estomago

Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...
Con formato ...

Preparación de
ciones intravenosa

Complicaciones

- Problemas oculares
- Ulceras
- Daños a los nervios
- Problemas renales
- Debilitamiento al sistema inmunitario

- Si la presentación de la solución es en bolsa, retira la cubierta de protección, coloca la bolsa sobre la mesa de preparación de me
nye
de
dica
manteniendo técn
coloca el marbete de identificación, una mezcla que contenga medicamentos vasoactivos, sedantes o algún medicamento especial además del marbete se utilizará el siguiente código de colores de cinta adhesiva, mismo que se colocará en la parte superior del frasco o bolsa: dopan
norepi
amaril
homog
- . Para
la solución, cierra la pinza de control de goteo, coloca la bolsa de solución en el portasueros, quita el protector del puerto de inyección, sujeta el puerto de inyección con dos dedos,
la b
ntos
inse
hará en un s
ángulo de 2
desprender p
tapón.

Trastorno de ánimo y síntomas depresivos

Se manifiesta con grados variables de depresión, euforia o irritabilidad.

Prevención

- Evitar el estrés prolongado
- Evitar situación de violencia
- Actividad física
- Cuiddo de apariencia
- Cuidar relaciones de familias y amigos

osteoporosis

aparece como consecuencia de la disminución de la cantidad de minerales en los huesos, por ejemplo, de calcio.

- Presiona la cámara de goteo y libera la presión hasta que el nivel de la solución llegue a la
mara
ol de
goteo, purga el equipo de infusión y al finalizar el purgado cierra la pinza.
- Traslada la mezcla a la unidad del paciente, verifica nombre del paciente, le informa sobre la mezcla intravenosa que se le va a iniciar.
- Instala la solución en la bomba de infusión, selecciona los parámetros indicados y verifica que el catéter esté permeable, e inicia la infusión.
- Realiza el registro en la hoja de atención de enfermería

Episodio depresivo

los ancianos tienen una mayor facilidad de sufrir fracturas. es más común en mujeres tras la menopausia debido a las carencias hormonales.

Síntomas emocionales:

- Animo o deprimido o triste
- Sentimiento de culpa o bajo autoestima
- Pesimista o exagerado.

Síntomas conductuales.

- Alteraciones de la actividad psicomotora.

Síntomas vegetativos.

- Aumento o disminución de apetito
- Aumento de sueño
- Fatiga o falta de energía
- Dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones

séptica se
momento.
Se recomienda no aforar la
la
os
de
del

Con formato: Párrafo de lista, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.27 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Espacio Después: 0 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Párrafo de lista, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.27 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Espacio Después: 0 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Párrafo de lista, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.27 cm

Con formato: Espacio Después: 0 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Párrafo de lista, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.27 cm

Con formato: Párrafo de lista, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.27 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial