



Nombre de alumnos: Deisy Domínguez Bautista

Nombre del profesor: Liliana Villegas López

Nombre del trabajo: cuadro comparativo

Materia: psicopatología I

Grado: 6to.cuatrimestre

Grupo: "A"

Pichucalco, Chiapas a 07 de junio de 2020

TRASTORNO DE ANSIEDAD

TRASTORNO	SINTOMAS
CRISIS DE ANGSTIA	<p>Aparicion temporal y aislada del miedo o malestar intensos que aparecen brucacamente desde que aparecen los sintomas hasata que alcance su maxima expresion.</p> <p>Sintomas:palpitaciones,sacudidas del corazon,sudoracion,temblores,falta de aliento,mareo o desmayo.</p>
AGORAFOBIA	<p>Consiste en un miedo y una ansiedad intensos de estar en lugares de donde es dificil escapar o donde no se podria disponer de ayuda generalmente involucra mied a multitudes o a estar solo.</p> <p>Sintomas:sentir temor de quedarse solo,sentir miedo a estar solo en lugares donde el escape podria ser dificil,sentir miedo a perder el control en esoacios publicos,dependencia de otros.</p>
TRASTORNO DE ANGSTIA CON AGORAFOBIA Y SIN AGORAFOBIA	<p>Trastorno de angustia con agorafobia:crisis de angustia inesperada recidivantes,inquietud persistente,ante la posibilidad de sufrir mas crisis,preocupacion,presencia de agorafobia ,afeca ritmo de vida normal,cambio enel comportamiento.</p> <p>Trastorno de angustia sin agorafobia:crisis de angustia inesperada recidivantes,preocupacion,cambio en el comportamiento,cambio en el comportamiento,ausencia de agorafobia,afecta la vida social.</p>

<p>FOBIA ESPECIFICA</p>	<p>Miedo irracional y sobredimensionado a elementos específicos, claramente diferenciados provoca casi irritablemente una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de una crisis de angustias situacional. En los niños la ansiedad puede traducirse en lloros ,berrinches, inhibición de abrazos ,ansiedad o malestar.</p>
<p>FOBIA SOCIAL</p>	<p>Temor acusado y persistente por una o mas situaciones sociales o actuaciones en publico,miedo persistente,ansiedad anticipatoria,pensamientos de que se veran envueltos en una situacion embarazosa temen a hacer el ridiculo temen a sentirse en apuros;existen palpitaciones,sudoracio,escalofrios,temblores, y nerviosismo.</p>
<p>TRASRORNO EXCESIVO COMPULSIVO</p>	<p>Pensamiento obsesivo,impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algun momento del trastorno como intrusos e inapropiados y causan ansiead o malestar significativas la persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos .comportamientos oactos mentales de carácter repetitivo que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obseccion .</p>
<p>TRASTORNO POR ESTRÉS POS TRAUMATICO</p>	<p>Ansiedad y recuerdos recurrentes desencadenados por un evento traumatico.trastorno caracterizaado por la imposibilidad de recuperarse despues de experimentar o presenciar un evento atemorizante. Sintomas:pesadillas,recuerdos repentinos,evitacion,reaccion exagerada ante el estimulo,ansiedad o depresion.</p>