



**Nombre de alumnos: Liz Adriana Silva Montes.**

**Nombre del profesor: Dr. Fernando Romero Peralta.**

**Nombre del trabajo: cuadro sinóptico.**

**Materia: generalidades médico- quirúrgico.**

**Grado: quinto cuatrimestre.**

**Grupo: semiescolarizado.**

PASIÓN POR EDUCAR

Dermatitis.

Es la inflamación de las capas superficiales de la piel.

Etiología.

Las causas conocidas incluyen la sequedad cutánea, el contacto con una sustancia en particular, ciertos fármacos, venas varicosas y rascado constante.

Signos y síntomas.

Erupción rojiza con picor, ampollas, llagas abiertas, exudación, costras y descamación.

Diagnóstico.

Suele realizarse en función de los síntomas y se confirma con los resultados de las pruebas cutáneas o de muestras de piel, o por la presencia de irritantes, fármacos o una infección.

Tratamiento.

Depende de la causa y de los síntomas concretos

Enfermedades  
papuloescamosas.

La papulosis linfomatoide es un linfoma cd30 positivo primitivamente cutáneo que cursa con brotes recurrentes de pápulas y nódulo auto involutivos sin que se produzca extensión del proceso.

Etiología.

Desconocida.

Clínica.

Erupción generalizada de pápulas o nódulos eritematosos que afectan el tronco y extremidades.

Epidemiología.

Ocurre principalmente en adultos. Menos del 10 % de los casos se inician en niños menores de 10 años<sup>2</sup>. La incidencia es similar en ambos sexos.

Tratamiento.

A pesar de la tendencia a la regresión espontánea de las lesiones, se suele instaurar tratamiento para intentar prevenir o limitar la cicatrización, para controlar los síntomas o para disminuir la frecuencia de las recurrencias. Sin embargo no hay evidencia de que el tratamiento modifique la historia natural de la enfermedad o disminuya el riesgo de degeneración maligna.

## Tumores de la piel.

Tumor es toda masa neoplásica con tendencia a persistir o crecer indefinidamente con independencia biológica del tejido donde se halla, sin utilidad para el organismo y de etiología aún desconocida.

Queratosis seniles o verrugas seborreicas y se las considera como los tumores epiteliales benignos más frecuentes. Se trata de una proliferación de queratinocitos basaloides que se suele acompañar de hiperqueratosis e hiperpigmentación.

Se denominan quistes cutáneos a aquellas cavidades incluidas en la dermis y/o la hipodermis revestida por epitelio y que contienen un material cuya consistencia oscila de líquido a sólido. Se clasifican en anexiales y no anexiales según deriven o no de la unidad pilo-sebácea.

Quiste epidermoide infundibular común.

Son formaciones intradérmicas que pueden elevar la epidermis, formando semiesferas con consistencia elástica y de tonalidad amarillenta o blanquecina con telangiectasias. Frecuentemente están centrados por un poro.