

Nombre del alumno:

Ignacia Bautista Gómez

Nombre del profesor:

Dr. Fernando Romero peralta

Nombre del trabajo:

Cuadro comparativo: alteraciones de la
cavidad oral y esófago

Materia:

Enfermería medico quirúrgica II

Grado:

6to. Cuatrimestre

Grupo: "A"

CUADRO COMPARATIVO

Alteraciones de la cavidad oral	Alteraciones del esófago
La mucosa oral forma parte del tracto digestivo superior y en ella pueden producirse enfermedades de origen local o sistémico	El esófago es el tubo muscular que transporta alimentos y líquidos desde la boca al estómago.
Cualquier alteración de la boca precisa de un examen minucioso de toda la cavidad oral: Mucosa oral, encías, paladar y lengua.	El problema más común con el esófago es la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).
Dentro de las alteraciones de la mucosa oral diferenciaremos varios apartados: Variaciones de la estructura normal	La ERGE ocurre cuando un músculo que se encuentra al final del esófago no se cierra adecuadamente. Esto permite al contenido del estómago volver hacia el esófago y lo irrite, conocido como reflujo. Con el tiempo, la ERGE puede causar lesiones en el esófago.
Lengua fisurada: aumento del número de canales o pliegues en el dorso de la lengua. Suele ser asintomática aunque puede sufrir alteraciones secundarias a procesos traumáticos (como el cepillado) o infeccioso	Las enfermedades esofágicas pueden manifestarse por disfunción o dolor. Las alteraciones funcionales principales son los trastornos de la deglución y el reflujo gastroesofágico excesivo
Glositis media romboidal: placa eritematosa en la porción central del dorso de la lengua. Se trata de una hiperplasia epidérmica cuya colonización por cándidas es frecuentísima.	El dolor, en ocasiones indistinguible de aquél de origen cardíaco, puede deberse a inflamación, infección, dismotilidad o neoplasia
Varices linguales: son vasos dilatados de color azul-violáceo ubicados, sobretodo, en las caras laterales y ventrales de la lengua. No tienen trascendencia clínica.	
Toro: exostosis o protuberancia ósea en la línea media del paladar duro.	
Infecciones víricas: Gingivostomatitis herpética aguda, Herpes labial recurrente, Enfermedad boca-mano-pie.	