

**Nombre de alumnos: Omar Adriel Maza Gómez.**

**Nombre del profesor: Lic. Fernando Romero Peralta**

**Nombre del trabajo: Cuadro comparativo**

**Materia: Enfermería Médico Quirúrgico II**

**Grado: Sexto cuatrimestre.**

PASIÓN POR EDUCAR

**Grupo: Semi-escolarizado**

### *Cuadro comparativo de los cuidados de enfermería*

	<b>Diálisis peritoneal</b>	<b>Hemodiálisis</b>	<b>Pacientes con Problemas que requieren cirugía renal</b>	<b>Pacientes intervenidos de cirugía renal</b>
<b>Cuidados de enfermería</b>	<p>Los cuidados de enfermería en pacientes que se van a someter a diálisis peritoneal tendrán dos fases diferenciadas. La primera incluye todos los preparativos previos a la diálisis como instrumentación e higiene entre otros. La segunda fase tiene lugar tras la diálisis y consiste en la vigilancia del estado del paciente y en controlar aspectos como higiene, peso y vestimenta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Evaluar acceso venoso</li> <li>-Supervisar preparación del circuito HD.</li> <li>-Evaluación del paciente renal a la llegada a la unidad.</li> <li>-Checar signos vitales del paciente cada 15 o 30 min.</li> <li>-Observe cuidadosamente a la persona buscando cualquier modificación del estado mental.</li> <li>-Curación adecuada del acceso vascular</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ayunas como mínimo cuatro horas antes de la intervención</li> <li>-Iniciar tratamiento inmunosupresor según criterio médico.</li> <li>-Iniciar tratamiento antibiótico según criterio médico.</li> <li>-Retirar prótesis y lentes de contacto y guardarlos en lugar seguro.</li> <li>-Desinfectar zona quirúrgica y cubrir con talla estéril.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-El paciente debe estar aislado (en la medida de lo posible) en atmósfera estéril de 5 a 10 días por el alto riesgo de infección debido al tratamiento inmunosupresor.</li> <li>-El paciente permanecerá en dieta absoluta hasta que tenga Peristaltismo intestinal. Seguirán después, todas las fases dietéticas que obliga una cirugía.</li> <li>-Los primeros días la higiene del paciente se hará en la cama.</li> </ul>

