



**Nombre del alumno: Omar Adriel Maza Gomez**

**Nombre del profesor: Lic. Fernando Romero Peralta**

**Nombre del trabajo: mapa conceptual**

**Materia: Enfermería, medico quirúrgico**


**Grado: 6**

**Grupo: "A"**

**PASIÓN POR EDUCAR**

# Tumor en la piel

Se clasifican



## Papuloescamosas

Cuando un exantema se caracteriza por lesiones elevadas, pápulas (<1 cm) o placas (>1 cm), con descamación, se denomina *papuloescamoso*.

### Las enfermedades papuloescamosas más frecuentes

psoriasis, tiña, pitiriasis rosada y liquen plano

Cuando las lesiones psoriásicas conllevan artritis

debe considerarse la posibilidad de artritis psoriásica o artritis reactiva


ntecedentes de úlceras bucales, conjuntivitis, uveítis o uretritis sugieren este último diagnóstico.

También se sabe que el litio, los bloqueadores  $\beta$ , la infección por virus de la inmunodeficiencia

y una disminución rápida de glucocorticoides sistémicos exacerbaban la psoriasis.

**Dermatitis**

Se clasifican



**Dermatitis atópica**

En general, este sarpullido rojo y con comezón

**suele comenzar en la infancia**

ocurre en los pliegues de la piel: en la parte interna de los codos, detrás de las rodillas y en la parte delantera del cuello

**Dermatitis de contacto**

Este sarpullido rojo y con picazón

e presenta donde la piel haya entrado en contacto

con sustancias que irritan la piel o causan una reacción alérgica.

Puedes presentar ampollas.

**Dermatitis seborreica.**

Esta afección causa manchas escamosas

enrojecimiento de la piel y caspa persistente

Por lo general, afecta las zonas oleosas del cuerpo

como la cara, la parte superior del pecho y la espalda

**Eccema folicular**

Con este tipo, la piel afectada se vuelve más gruesa

y presenta protuberancias en los folículos pilosos.

Esta afección es común en los afroamericanos y en las personas con piel de color marrón oscuro.