



Nombre de alumnos: Liz Adriana Silva Montes.

Nombre del profesor: Dr. Fernando Romero peralta.

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico disfunción cardiaca.

Materia: patología del adulto.

Grado: 6to cuatrimestre.

Grupo: semiescolarizado.

PASIÓN POR EDUCAR

Disfunción Cardíaca.

se produce cuando hay un desequilibrio entre la capacidad del corazón para bombear sangre y las necesidades del organismo.

Etiología.

El corazón puede fallar debido a un problema propio o porque su capacidad de reacción no alcanza a satisfacer lo que el organismo le demanda.

Cardiopatía isquémica, miocardiopatías, valvulopatías, arritmias.

Cuadro clínico.


Cansancio anormal. Respiración fatigosa por estancamiento de los líquidos en los alvéolos de los pulmones. Sensación de plenitud del abdomen, anorexia (falta de apetito). A veces puede aparecer tos seca y persistente motivada por la retención de líquido en los pulmones o por el tratamiento con inhibidores de la enzima de conversión. La reducción del flujo sanguíneo al cerebro puede provocar sensaciones de mareo, confusión, mente en blanco y breves pérdidas de conciencia. La insuficiencia puede provocar que el flujo de sangre a los riñones no sea suficiente, y se produzca retención de líquidos por disminución de la orina. Esta hinchazón suele localizarse en las piernas, los tobillos o el abdomen. Y a veces se orina más por la noche que por el día (nicturia). Falta de aire (disnea) con el esfuerzo y mala tolerancia al ejercicio por fatiga.

Diagnostico.

Factores de riesgo cardiovascular en el paciente. Antecedentes de cardiopatía isquémica. Hipertensión o diabetes. Antecedentes familiares de miocardiopatías o enfermedades valvulares. Infecciones recientes. Síntomas relacionados con la tolerancia al esfuerzo. Hinchazón. Alteraciones del ritmo cardíaco. Exploración física para comprobar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Auscultación cardíaca y pulmonar. Exploración abdominal.

Insuficiencia cardiaca

Qué es?



Factores de riesgo.

- Edad
- Hipertensión arterial
- Hipertrofia ventricular izquierda
- Diabetes mellitus
- Obesidad
- Tabaquismo
- Antecedentes de infarto de miocardio

Síntomas de la insuficiencia cardíaca

<p>Dificultad para respirar</p>	<p>Tos seca y sustancias</p>	<p>Fatiga</p>	<p>Pérdida de apetito</p>
<p>Hinchazón y aumento de peso</p>	<p>Nicturia</p>	<p>Mareos y confusión</p>	<p>Palpitaciones</p>

Prevención.

- Evitar tabaco y alcohol.
- Evitar consumo excesivo de sal.
- Hacer ejercicio.
- Alimentarse sanamente.

