



Nombre Del Alumno:

Alvarez gomez jesus

Nombre Del Profesor:

Lic. Liliana Villegas López

Nombre Del Trabajo:

Cuadro comparativo "Trastorno de conversión"

Materia:

Psicopatología

Grado:

6°

Grupo:

"A"

Licenciatura:

Psicología General

Pichucalco, Chiapas a 13 junio de 2020

Trastorno de conversión					
Criterios diagnosticos	Características diagnosticas	prevalencia	Desarrollo y curso	Factores de riesgo	pronostico
<p>Uno de los síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria.</p> <p>Los hallazgos clínicos aportan pruebas de la incompatibilidad entre el síntoma y las afectaciones neurológicas o médicas reconocidas.</p> <p>El síntoma o deficiencia no se explica mejor por otro trastorno médico o mental.</p>	<p>Los síntomas motores son debilidad o parálisis, movimientos anormales, como el temblor o las distonias, alteraciones de la marcha y la postura normal de los miembros.</p> <p>Los síntomas sensoriales son la alteración, la reducción o la ausencia de sensibilidad de la piel, la vista o el oído.</p>	<p>Los síntomas de conversión transitorios son frecuentes, pero la prevalencia exacta del trastorno es desconocida.</p> <p>Esto es en parte debido a que el diagnóstico, requiere la evaluación en un nivel especializado de atención.</p> <p>La incidencia de síntomas de conversión individuales persistentes se estima en 2-5/100.000 por año.</p>	<p>Se ha documentado su inicio durante toda la vida.</p> <p>El inicio de los ataques no epilépticos alcanza su máximo en la tercera década y los síntomas motores tienen su máxima frecuencia de aparición en la cuarta década.</p> <p>Los síntomas pueden ser transitorios o persistentes.</p>	<p>Temperamentales Frecuentemente se asocian rasgos de personalidad desadaptativos con el trastorno de conversión.</p> <p>Ambientales: puede haber antecedentes de abuso y negligencia en la infancia.</p> <p>Genéticos y fisiológicos: la presencia de una enfermedad neurológica que cause síntomas similares constituye un factor de riesgo.</p>	<p>Modificadores Del curso, La corta duración De los síntomas Y la aceptación Del diagnóstico Son factores Pronóstico Positivos.</p>

