



**Nombre de alumnos:** Jessica Guadalupe  
Valdivia Herrera

**Nombre del profesor:** Liliana López Villegas

**Nombre del trabajo:** cuadro comparativo

**Materia:** psicopatología

PASIÓN POR EDUCAR

**Grado:** 6 cuatrimestre

**Grupo:** único

Pichucalco, Chiapas

	Que es	Criterios diagnósticos	Características diagnósticas	Factores de riesgo
<b>TRASTORNO DE CONVERSIÓN</b>	Es una afección mental en la cual una persona presenta ceguera, parálisis u otros síntomas del sistema nervioso (neurológicos) que no se pueden explicar por medio de una valoración médica	los hallazgos clínicos aportan pruebas de la incompatibilidad entre el síntoma y las afecciones neurológicas o médicas reconocidas.	Los síntomas motores son debilidad o parálisis, movimientos anormales, como el temblor o las distonías, alteraciones de la marcha y la postura anormal de los miembros. • Los síntomas sensoriales son la alteración, la reducción o la ausencia de sensibilidad de la piel, la vista o el oído	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperamentales.</li> <li>• Ambientales.</li> <li>• Genéticos y fisiológicos.</li> </ul>
<b>TRASTORNO DISOCIATIVO</b>	se caracterizan por una interrupción y/o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento	Presencia de dos o más identidades o estados de personalidad (cada una con un patrón propio y relativamente persistente de percepción, interacción y concepción del entorno y de sí mismo)	El trastorno puede ser identificado por dos grupos de síntomas: 1) las alteraciones repentinas o la discontinuidad sobre el sentido del yo y el sentido de la entidad (Criterio A), y 2) las amnesias disociativas recurrentes (Criterio B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los individuos con trastorno de identidad disociativo típicamente presentan comorbilidad con:</li> <li>• La depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias, las autolesiones, las convulsiones no epilépticas u otros síntomas comunes</li> </ul>
<b>Amnesia disociativa</b>	incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario	Las historias de trauma, de abuso de menores y la victimización son frecuentes. Algunos individuos con amnesia disociativa informan de flashbacks disociativos (p. ej., la reexperimentación de los eventos traumáticos). • Muchos tienen antecedentes de automutilación, de intentos de suicidio y otros comportamientos de	Debe almacenarse con éxito en la memoria, y • 2) Normalmente sería recordada fácilmente (Criterio A). La amnesia disociativa se diferencia de las amnesias permanentes debido al daño neurobiológico o a la toxicidad que impiden el almacenamiento • La amnesia localizada es la incapacidad de recordar hechos durante un período restringido de tiempo	Ambientales Genéticos y fisiológicos.

<b>Trastorno de despersonalización</b>	esrealización se caracteriza por una sensación persistente o repetitiva de separación del propio cuerpo o de los propios procesos mentales, como un observador externo de la vida (despersonalización) y/o como sentirse totalmente desconectado del entorno que le rodea a uno	Trastorno de ansiedad por enfermedad. Aunque los individuos con trastorno de despersonalización/desrealización pueden presentar síntomas somáticos vagos, así como el temor a un daño cerebral permanente	Las características esenciales del trastorno de despersonalización/desrealización son episodios persistentes o recurrentes de despersonalización, desrealización o ambas	Temperamentales. Los individuos con trastorno de despersonalización/desrealización se caracterizan por presentar un temperamento evitativo de daños, defensas inmaduras y tanto esquemas de desconexión como de sobreconexión.