

UNIVERSIDAD DEL
SURESTE



TAREA: PREGUNTAS
Y CUADROS

NOMBRE DE LA DOCENTE: GABRIELA PRIEGO JIMENEZ

NOMBRE DEL ALUMNO: HECTOR CRUZ RIOS

GRADO: 3°

GRUPO: D

1.1. ¿DEFINE EL CONCEPTO DE PERSONA? Es un individuo humano hombre o mujer que, considerado desde la noción jurídica y moral, es también un sujeto consiente y racional, con capacidad de discernimiento y de respuesta sobre sus propios actos.

¿DEFINE EL CONCEPTO DE SALUD? Estado en que un ser u organismos vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones.

¿DEFINE EL CONCEPTO DE ENFERMERIA? La enfermería es la profesión del cuidado que enfatiza las relaciones humanas, la ayuda y el autocuidado mediante la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y el cuidado a aquellos que lo necesitan.

1.2. ¿ELABORARAS UN CUADRO PSICOTICO DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ENFERMERIA?

1.3. ¿DEFINE QUE ES EL DIAGNOSTICO DE SALUD? El diagnóstico integral de salud (DIS) es definido por Pineault como una técnica de investigación que permite identificar y analizar la situación de salud de una comunidad o población, con el objeto de determinar problemas y necesidades de salud, caracterizar los factores determinantes, como parte de un proceso que no concluye hasta que se encuentren soluciones a los problemas detectados.5 De acuerdo a lo anterior, es importante destacar dentro de este contexto tres aspectos fundamentales: 1. Condiciones de salud, 2. Factores determinantes y 3. Respuesta social organizada.

¿ELABORAR UN CUADRO PSINOPTICO DE LA VALORACION DEL NUCLEO FAMILIAR?

¿CUAL SERIA EL OBJETIVO DEL DIAGNOSTICO DE SALUD? Un diagnóstico de salud es el conocimiento aproximado de las diversas problemáticas de una población objetivo, a partir de la identificación e interpretación de los factores y actores que determinan su situación, un análisis de sus perspectivas y una evaluación de la misma.

¿ELABORARAS EN UNA HOJA DE TAMAÑO OFICIO UN CUADRO CON LAS DIFERENTES VACUNAS DEL CUADRO BASICO QUE CONTENGA: TIPO DE VACUNA, CONTRA QUE ENFERMEDAD PROTEGUE. VIA DOSIS.SITIO DE APLICACIÓN, REACCIONES SECUNDARIAS?

ETAPAS DEL
PROCESO DE
ENFERMERIA

VALORACION

OBTENER INFORMACION
DEL CLIENTE- IDENTIFICAR
LAS NECESIDADES-
RECOÑECCION DE DATOS
ORGANIZACIÓN Y
VALORACION.

DIAGNOSTICO

ANALIZAR Y INTERPRETAR
LOS DATOS- EXTRAER
CONCLUSIONES- FORMULAR
DIAGNOSTICOS, ANALIZAR
LOS DATOS, IDENTIFICAR
EL PROBLEMA DE SALUD Y
LOS RIESGOS

PLANIFICACION

PRIORIZAR ENFERMEDAD
-CORREGIR Y REDUCIR AL
MAXIMO LOS PROBLEMAS
-SELECCIONAR LAS
INTERVENCIONES DE
ENFERMERIA

EJECUCION

DETERMINAR LAS
NECESIDADES DE
EXISTENCIA DE
PROFECIONAL DE
ENFERMERIA- EJECUTAR
LAS INTERVENCIONES DE
ENFERMERIA- REGISTRAR
LAS ACTIVIDADES DE
ENFERMERIA

EVALUACION

OBTENER LOS DATOS CON
LOS RESULTADOS
COMPARAR LOS DATOS CON
LOS RESULTADOS
-CONTINUAR Y MODIFICAR O
FINALIZAR EL PLAN DE
CUIDADOS DEL PACIENTE.

NUCLEO
FAMILIAR

TIPO DE
FAMILIA

FAMILIA NUCLEAR ES AQUEL DONDE VIVEN, BAJO UN MISMO TECHO, PADRE, MADRE E HIJOS, O BIEN, PADRE Y MADRE SOLOS. FAMILIAR EXTENSO: EN UN MISMO HOGAR ESTA EL PADRE O MADRE, HIJOS Y OTROS PARIENTES COMO ABUELOS, PRIMOS O TIOS. FAMILIAR MONO PARENTAL: ES EL QUE ALBERGA A UN PADRE O MADRE SIN PAREJA CON SUS RESPECTIVOS HIJOS. NO FAMILIAR: SE TRATA DEL HOGAR DONDE VIVEN ALGUNOS AMIGOS O CONOCIDOS, SIN LAZOS CONSANGUINEOS NI POLITICOS QUE SE UNEN PARA COMPARTIR GASTOS, COMPAÑÍA, RECURSOS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES.

LA FAMILIA
COMO
INSTITUCION

LA FAMILIA ES UNA INSTITUCION CON FUNCIONES SOCIALES PROPIAS. ASI COMO LA ESCUELA ES RESPONSABLE DE TRASMITIR A LO NIÑOS EL CONOCIMIENTO QUE LAS SOCIEDADES HA ACUMULADO, ENSEÑARLES VALORES Y NORMAS GRUPALES Y OFRECERLES UN ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA CON OTROS NIÑOS, LA FAMILIA, COMO INSTITUCION, ES EL ESPACIO DONDE LAS PERSONAS DESARROLLAN RELACIONES PERSONALES INTIMAS

LA FAMILIA
COMO EJE
DE LA POLITICA
DE POBLACION.

SU PROPOSITO ES CONTRIBUIR, JUNTO CON LAS DEMAS PONLACION Y DESARROLLO DE 117 POLICIAS SOCIALES Y ECONOMICAS, A IMPULSAR EL DESARROLLOSUSTENTABE DEL PAIS Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, FAVORECIENDO LA CREACION DE CONDICIONES SOCIODEMOGRAFICAS ADECUADAS A ESTE FIN ATRAVES DE MEDIDAS VINCULADAS CON LA DINAMICA, LA ESTRUCTURA Y LA DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LA POBLACION PARA QUE ESTO SE CONVIERTA EN REALIDAD TANGIBLE SE CONSIDERA A LA FAMILIA COMO UNO DE LOS PRIMEROS Y FUNDAMENTALES EJES.

SR (DOBLE VIRAL)	0.5 ml	Sarampion y Rubeola	Sin antecedente de la vacuna	En el 1er. Contacto	Brazo Izquierdo en la Region Superior Deltoides	Subcutanea Angulo de 45°	Padecimiento febril igual o mayor a los 38°C, Hipersensibilidad al componente de la vacuna, Pacientes con tratamiento con corticoesteroides, inmunopresores o citotoxicos, Pacientes con cancer, VIH con cuadro asintomatico, con cuadros convulsivos, con alteraciones neurologicas. Se evita en mujeres embarazadas.	Informar y explicar sobre la vacuna, Verificar el esquema de vacunacion, Valorar el estado de salud, pesar y medir al usuario. En las 48hrs despues de la vacunacion puede presentar fiebre menor de 38.5°C, dolor, enrojecimiento y endurecimiento en el sitio de la aplicacion. Evitar dar masajes, colocar compresas calientes, administrar medicamentos. En caso de fiebre tomar liquidos y realizar baños de agua templada. En caso de malestares como artritis y astralgias acudir con el medico.	Adolesce. Hombres Mujeres
			Esquema incompleto	Dosis unica en el 1er. Contacto.					
Tdpa	0.1 ml	Tetanos, Difteria y Tosferina	Unica, apartir de la semana 20 del embarazo.		Brazo Izquierdo en la Region Superior Deltoides	Intramuscular Profunda Angulo De 90°	Padecimiento febril igual o mayor a los 38°C, Hipersensibilidad a los componentes de la vacuna.	Informar y explicar sobre la vacuna y sitio de aplicacion, Verificar esquema de vacunacion en la cartilla, valorar el estado de salud, pesar y medir al usuario, puede presentar molestia como calor, dolor y enrojecimiento en el sitio de vacunacion, y Evitar dar masajes, colocar compresas calientes o administrar medicamentos. En caso de fiebre tomar liquidos y realizar baños de agua templada. En caso de malestares acudir con el medico.	Adolesce. Mujeres
SABIN	2 gotas 0.1 ml	Poliomielitis	Se aplica una dosis inicial de 0.1ml (2 gotas), a niños de 6 meses a 4 años de edad, en la 1era. Y 2da. Semana Nacionales de Salud de vacunacion, siempre y cuando el menor haya recibido la D.I. Se administra como una dosis adicional y de refuerzo		Sobre El Carrillo De La Boca	Via Oral	Padecimiento febril igual o mayor a los 38°C, Hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, con cuadro clinico de SIDA, Usuarios con tratamiento a base de corticoesteroides y inmunosupresores.	Informar y explicar sobre la vacuna y sitio de aplicacion, Verificar esquema de vacunacion en la cartilla, valorar el estado de salud, pesar y medir al usuario. Esta vacuna no presenta molestia.	Niños