



**universidad del sureste**


**Materia:** farmacología y veterinaria I

**Trabajo:** CUANDRO SINOPTICO

**Docente:** mvz, francisco David Vázquez morales

**Alumna:** Blanca Samahi Pérez Pérez

**Grado:** 3 cuatrimestre p: Lic., Mvz



XILACINA

ES UN SEDANTE Y MIORRELAJANTE Y ANALGESICO NO NARCOTICO

EL EFECTO RELAJANTE MUSCULAR ESTA BASADO EN LA INHIBICION DE LA TRANSMICION

EFECTOS PRINCIPALES SE DESARROLLAN DENTRO DE LOS 10 A 15 MIN. DESPUES DE LA INYECCION INYTRA. 3 A 5 MIN, DESPUES DE LA INYECCION ENDOVENOSA

ANESTECICO Y RELAJANTE MUSCULAR INDICADO PARA SUJECCION

EXCLUSIVO PARA FELINOS Y CANINOS

UN ESTADO SIMILAR AL SUEÑO, CUYA PROFUNDIDAD DEPENDE DE LA DOSIS

LA BIODISPONIBILIDAD ES VARAIBLE SEGÚN LA ESPECIE

CABALLO: 40 A 48% OVEJA: 17 Y 73 % PERRO: 52 Y 90 %

NO NARCOTICO, NO BARBITURICO DE ACCION RAPIDA

APLICACIÓN INYECTABLE, FRASCO CON LIOFILIZADO