

causas de aborto



CAUSAS DE ABORTO

El aborto bovino es un factor limitante del desarrollo ganadero en todos los países del mundo.

Las causas más comunes son:

- Endotoxinas
- Administración de corticosteroides
- Alteraciones genéticas
- Asincronía hormonal
- Problemas teratogénicos
- Plantas tóxicas

CAUSAS INFECCIOSAS DE ABORTO

- Bacterianas:
- Brucelosis
- Leptospirosis
- Vibriosis
- Haemophilosis
- Ureaplasma
- Clamidiasis

- Virus:
- IBR
- DVB
- VRSB

- Hongos (micotoxinas):
- Protozoarios

CAUSAS DE ABORTO DE ACUERDO A LA ETAPA DE GESTACIÓN

Abortos tempranos (0 a 3 meses)

- Lengua azul
- Diarrea viral bovina
- Trichomoniasis

Abortos en período intermedio (4 a 6 meses)

- Arcanobacteriosis
- Diarrea viral bovina
- Brucelosis
- Campylobacteriosis
- Rinotraqueitis infecciosa bovina
- Tricomoniasis (hasta el 5 ° mes)
- Levaduras (candidiasis)

Abortos a término (7 a 9 meses)

- Arcanobacteriosis
- Anaplasmosis
- Bacillus spp.
- DVB
- Brucelosis
- Aborto epizootico bovino
- Hongos

- Leptospirosis
- Listeriosis
- Neosporosis
- Ureaplasmosis