

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

NOMBRE DEL DOCENTE: M.V.Z Roberto Barreda García Sedano

NOMBRE DEL ALUMNO: Leonel Antonio Roblero Gonzalez

MATERIA: zootecnia en porcino



TRABAJO: ciclo de reproducción

GRADO: Sexto cuatrimestre

FECHA: 18/junio/2020

Producción porcina

Ciclo reproductivo

se desarrolla en dos líneas de producción que funcionan paralelamente, Por una parte la producción de lechones destetados y de otra la producción de cerdo engordado para el matadero.

Reproductivo de la madre

Tiene una duración aproximada de entre 20 y 22 semanas, dependiendo fundamentalmente de la duración gestación cubrición maternidad transición cebo matadero reposición 10 de la lactación.

Lactancia

Dura normalmente 8 semanas. Por su parte el ciclo de engorda tiene una duración promedio de 20 semanas

Ciclo del lechón

se realiza en tres periodos consecutivos: Periodo de lactancia mientras el lechón permanece con la madre (3-4 semanas). Periodo de destete/transición con una duración aproximada de entre 5 y 7 semanas. Periodo de crecimiento y cebo de alrededor de 14-15 semanas.

Ciclo de engorda

Se divide en dos periodos de cerca de 10 semanas cada uno. El primer periodo suele llamarse periodo de crecimiento. Termina cuando el animal ha alcanzado un peso vivo de 60 kg. El siguiente periodo denominado de finalización, termina cuando el animal ha logrado un peso vivo de unos 100 kg.