

## Manejo de un lechón

### Vitaminas

Se ha descrito en algunos estudios que la suplementación dietética de algunas vitaminas por encima de las necesidades estimadas de la NRC, como la vitamina E, la vitamina C y la vitamina B, mejora la respuesta inmune en cerdos destetados. Las inyecciones de hierro se deben aplicar entre los 3 y 5 días de vida.

### Castración

Es una práctica habitual. Normalmente se realizan dos incisiones en la zona del escroto. Los testículos son liberados de los tejidos circundantes y extraídos para ser eliminados mediante el corte del cordón espermático. El momento adecuado para realizar la operación es antes de las 3 semanas de vida.

### Corte de cola

Prevenir mordeduras de la cola. Hasta que los motivos para el corte se comprendan por completo y se puedan aplicar métodos preventivos con una tasa de éxito del 100%, la extirpación de la mayor parte de la cola en el nacimiento reducirá los problemas posteriores relacionados con el bienestar. Las mordeduras de la cola causan infección, abscesos en la columna, dolor intenso y penalización de la canal en el momento del sacrificio. El mejor momento para extirpar la cola es entre las 12 y 72 horas después del nacimiento. Cuando se administran inyecciones se recomienda esperar 3 días.

### Descolmillado

Los lechones nacen con dientes caninos afilados en las esquinas de los maxilares superior e inferior. Estos dientes pueden traumatizar las ubres de la cerda y la cara de otros lechones. La lesión cutánea puede provocar una epidermitis exudativa. La cerda se puede negar a amamantar si ha sufrido lesiones de este tipo. El corte de los colmillos se debe realizar 6 horas después del nacimiento, hasta que los lechones hayan ingerido cantidades suficientes de calostro. Si el procedimiento se realiza antes de ese momento predispone a la infección articular.